

Estabilidad de la comorbilidad entre el TND y los TA en preescolares



CORE
SALUT
MENTAL

V. Martín^{1,2}, R. Granero^{1,3}, JM. Domènech^{1,3} y L. Ezpeleta^{1,2}

¹Unitat d'Epidemiologia i de Diagnòstic en Psicopatologia del Desenvolupament (2014 SGR 312)

²Departament de Psicologia Clínica i de la Salut

³Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències i del Comportament



Objetivo

Explorar la estabilidad de la comorbilidad entre el trastorno negativista desafiante (TND) y los trastornos de ansiedad (TA) en niños/as preescolares

Método

Diseño

Muestra comunitaria

622 preescolares (3 años)
574 preescolares (5 años)

Grupo TND	Grupo TA	Grupo TND+TA
<i>n</i> = 44	<i>n</i> = 42	<i>n</i> = 17
<i>n</i> = 31	<i>n</i> = 60	<i>n</i> = 15

Edad 3
Edad 5

Medidas

Diagnostic Interview for Children and Adolescents for Parents of Preschool and Young Children *DICA-PPYC*
(Reich y Ezpeleta, 2009)



Resultados

Edad: 5 años	Edad: 3 años	
	Ausente	Presente
Presente	11 1,50%	4 0,35%
Ausente	548 96,7%	11 1,50%

Incidencia de desarrollar comorbilidad TND+TA de los 3 a los 5 años

1,60%

(IC 95%: 0,84 a 3,02)

Riesgo de remisión de comorbilidad TND+TA durante los 3-5 años

80%

(IC 95%: 49,0 a 94,3)



Conclusiones

- La comorbilidad entre TND+TA tiene una estabilidad débil desde los 3 a los 5 años. Otros estudios, como Lavigne et al. (2001), han hallado valores moderados-altos.
- La existencia de estabilidad de comorbilidad entre TND+TA pone de manifiesto la necesidad de estrategias de intervención debido al deterioro funcional que provoca esta psicopatología conjunta en los niños y que puede persistir a lo largo del desarrollo.