


Annexos

Annex I: Mapes de Patrimoni

Annex II: Descripció del hàbitats

Annex III: Descripció dels models de combustibilitat i inflamabilitat

ANNEX I: MAPES DE PATRIMONI



Patrimoni	Símbol	Descripció
Natural		Zones d'interès natural
		Espècimens botànics singulars
Immoble		Elements arquitectònics (edificis, elements arquitectònics i obra civil)
		Jaciments

Figura 7.1: Patrimoni natural i immoble de l'àmbit d'estudi. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DIBA

I.1 PATRIMONI NATURAL

Espècimens botànics singulars





Figura I.1.Localització i descripció dels espècimens botànics singulars. Elaboració pròpia a partir de dades de DIBA

Zones interès




Element	Nom	Ubicació	Descripció	Protecció	Estat de conservació
1	Bassa de les bassotes	PN Cadí-Moixeró	Bassa natural al peu de les cigles de la bola. Abeurador natural	inexistent	bo
2	Balma del Calderer	PNIN Pedraforca	Balma natural sobre la tartera del Pedraforca i sota del cim Caldeer. Producte de la degradació d'un estrat per acció eòlica	Inexistent	bo
3	Massís del Pedraforca	PNIN Pedraforca	Massís del Pedraforca	Llei 6/1982	bo
4	Cova de la troballa de la Marededéu de Gresolet	PNIN Pedraforca	Cova petita situada darrera del Santuari de la Marededéu de Gresolet	inexistent	bo
5	Riera Salada	Al límit del PN Cadí-Moixeró	Riera caracteritzada per la seva salinització deguda als materials geològics (guixos i sal mineral (halita)).	inexistent	Bo

Figura 1.2: Localització i descripció de les zones d'interès. Elaboració pròpia a partir de DIBA

I.2 PATRIMONI IMMOBLE

Elements arquitectònics




Element	Nom	Ubicació	Descripció	Protecció	Estat de conservació
1	Barraca de pastor de les costes	PN Cadí-Moixeró	Barraca d'estil contemporani situat sobre els Cingles de Gresolet. Emprat pels pastors. Ús actual: refugi per pastors i excursionistes	inexistent	bo
2	Santa Maria de Gresolet	PNIN Pedraforca, a la vall de Gresolet	Santuari de Gresolet (s.XIII) d'estil modern i contemporani	inexistent	bo
3	Centraleta de Campdejou	PNIN Pedraforca, Gresolet	Centraleta pel proveïment d'electricitat (1930-1940). Es troba mig en ruïnes	inexistent	dolent
4	Molí de Cal Ferrer	PN Cadí-Moixeró (camí de Saldes a Gresolet)	Molí que data de 1276. Es troba quasi enrunat, resten petits murs	inexistent	dolent
5	Molí de la Palanca	Al límit del PN Cadí-Moixeró	Moli de farina del s.XVIII reconvertit en habitatge	inexistent	bo
6	Pallissa de Cal Melitón		Edifici cobert de teulada de doble vessant. La façana combinada de pedra i fusta és l'element més característic. s.XIX. Actualment es conserva d'empús tot i que al costat hi ha un edifici en ruïnes.	inexistent	regular
7	Molí de les Flors	PN Cadí-Moixeró Situat forra del	s.XIX Molí que durant el funcionament de les mines de carbó feia d'hostal	inexistent	bo

		nucli de Saldes			
8	Creu del cementiri de Saldes	PNIN Pedraforca. Situació al nucli de Saldes	Creu a l'interior del cementiri de Saldes	inexistent	bo
9	Pallissa de Cal Bensoi	PNIN Pedraforca. Situació al nucli de Saldes	Masia de pallissa amb façana peculiar de fusta s.XVIII-XIX	inexistent	bo
10	Antic Safareig de Saldes	PNIN Pedraforca. Situació al nucli de Saldes	Antic safareig rectangular. s.XVIII-XIX. Actualment en desús i tapiat.	inexistent	bo
11	Sant Martí de Saldes	PNIN Pedraforca. Situació al nucli de Saldes	Església de Sant Martí de Saldes. S.XIX	inexistent	bo
12	Cal Baldari	PNIN Pedraforca. Situació al nucli de Saldes	Masia de pallissa s. XV . Una de les masies més antigues del nucli de Saldes	inexistent	bo
13	Castell de Saldes	PNIN Pedraforca. Situació al nucli de Saldes	Restes del Castell de Saldes. Es troba en ruïnes, tot i que consolidat. S'inicià la construcció el 1065, fou abandonat al s.XVII	BCIN: R-I-51-5625	regular
14	Santa Maria del castell de Saldes	PNIN Pedraforca. Situació al nucli de Saldes	Capella situada al costat del Castell de Saldes. Data de finals de s.XIII, resten pocs elements originals.	inexistent	bo
15	Barraca de pastor de Cal Calderer	PNIN Pedraforca. Barri Sobirà de Saldes	Barraca excavada a la muntanya, de dos metres de diàmetre. Probablement emprada com a refugi pels pastors. S.VIII-XIX	inexistent	bo
16	Les Serres	PNIN Pedraforca. Situació al nucli de Saldes	Antiga casa, considerada una de les més importants del terme, actualment en runes sota la rectoria de Sadess.XIII-XIV		dolent
17	Sant Andreu de l'Espà	Espà	Església de teula àrab s.XIII-XX	inexistent	regular
18	Creu de Pedró	Espà	Creu i Capelleta del Sant Crist del s.XIX	inexistent	bo
19	Mina Pis Tercer		Boca principal de l'explotació minera fins el 2007	inexistent	bo
20	Ca la Susagna		Masia del s.XVIII-XIX. Habitada actualment	inexistent	bo
21	Torres del telefèric de l'Espà	Espà	Telefèric que unia la mina Clara amb Vallcebre. Tan sols queden algunes restes de les antigues torres	inexistent	dolent
22	Antiga mina Clara	Espà	Barraca en ruïnes de l'explotació de la mina Clara (1940-1944)	inexistent	dolent
23	Molí de les Llenes	PN Cadí-Moixeró. Al costat de la Riera de Saldes	Molí medieval que data del s.XVIII, abandonat abans de la Guerra Civil. Actualment en runes, tan sols queden restes dels murs	inexistent	dolent
24	Santa Maria del Castell de Gósol		Datat al s.XI. Dins el seu recinte inclou les restes d'un nucli de població (Vila Vella)	inexistent	
25	Església de Santa Maria de Gósol	Nucli de Gósol		inexistent	
26	Molí de Gósol		Ús actual: refugi-alberg	inexistent	

Figura 1.3: localització i descripció dels elements que conformen el patrimoni arquitectònic. Elaboració pròpia a partir de DIBA

Jaciments



Element	Nom	Ubicació	Descripció	Protecció	Estat conservació
1	Jaciment fòssilífer del Pedraforca	Massís del Pedraforca	Fòssils del grup dels foraminífers i invertebrats del Cretaci inferior	Inexistent	Bo
2	Jaciment de l'Espà	Espà	Fòssils del grup dels rudistes agrupats en denses colònies. Cretaci superior	Inexistent	Bo
3	Jaciment fòssilífer de Gresolet	Gresolet	Fòssils del grup Foraminífers i Briozoos	inexistent	Bo
4	Jaciment paleontològic Coll de Jou	Coll de Jou	Jaciment de petjades de dinosaure (veta de Fumanya) i fòssils ambients marins.	Incoat BCIN	Bo. En estudi
5	Jaciment paleontològic del Pis Tercer	Bocamina. Saldes	Jaciment de petjades de dinosaure a la paret on s'obre la bocamina del ps tercer de Carbones Pedraforca (veta Fumanya)	Inexistent.	Bo. En estudi

Figura I.4. Localització i descripció dels jaciments fòssils. Elaboració pròpia a partir de dades de DIBA

ANNEX II: DESCRIPCIÓ DELS HÀBITATS

BOSCOS ACICULIFOLIS

Avetoses amb <i>Pulsatilla font-queri</i> , calcícoles, de l'estatge subalpí dels Pirineus				
Codi CORINE	31.431	Codi CHC	Codi CHC	42d
Superfície (ha)	574470,7	Percentatge	Percentatge	1,45
Aspecte	Boscoss constituïts per un estrat arbori d'avets (amb algun pi negre dispers) i un sotabosc herbaci molt semblant al del bosc de pi negre amb pulsatilla			
Ecologia	Àrees biogeogràfiques: Estatge subalpí (i altimontà). Ambients que ocupa :Vessants obacs, molt pendents. Clima : Subalpí subcontinental. Substrat i sòl :Substrat calcari; sòls poc o molt pedregosos			
Flora principal	Estrat arbori	<i>Abies alba</i> (Avet)		
	Estrat arbustiu	<i>Buxus sempervirens</i> (Boix)		
	Estrat herbaci	<i>Pulsatilla alpina</i> subsp. <i>font-queri</i> (flor del vent), <i>Festuca gautieri</i> (ussona) <i>Pyrola</i> spp. , <i>Valeriana montana</i>		
Gestió	Convindria no tallar aquestes avetoses, tenint en compte la poca superfície que ocupen en territori català i els forts pendents on es fan			

Boscos de pi negre (<i>Pinus uncinata</i>) generalment amb neret (<i>Rhododendron ferrugineum</i>), acidòfils i mesòfils, dels obacs pirinencs			
Codi CORINE	42.413	Codi CHC	42f
Superfície (ha)	97807,8	Percentatge	0,25%
Aspecte	Boscos amb dominància de pi negre. En estat de desenvolupament òptim, els arbres són alts i creixen espessos, però rarament aquests boscos resulten gaire ombrívols, a causa de la forma llarga i estreta de les capçades dels pins. En general comprenen, a banda del dosser arbori, tres altres estrats poc o molt diferenciats: un d'arbustiu alt, dominat pel neret; un d'arbustiu baix, format essencialment per la nabinera; i un d'inferior, amb plantes herbàcies, líquens i molses. Aquestes darreres solen fer tapisos extensos. A les zones més elevades, aquest bosc pot esdevenir, de manera natural, poc o molt esclarissat i establir un trànsit gradual vers els neretars.		
Ecologia	biogeogràfiques : Estatge subalpí (rarament a l'altimontà). Ambients que ocupa: Típicament vessants obacs, amb bona innivació. En el paisatge actual, només en alguns vessants poc explotats aquesta pineda ateny realment el seu límit natural superior; en general, la pressió de la pastura l'ha expulsat de les parts més altes. Clima :Subalpí. Substrat i sòl : Sempre terrenys àcids (o sòls acidificats).		
Flora principal	Estrat arbori	<i>Pinus uncinata</i> (Pi negre)	
	Estrat arbustiu	<i>Rhododendron ferrugineum</i> (neret), <i>Vaccinium myrtillus</i> (nabinera)	
	Estrat herbaci	<i>Pyrola</i> sp.	
Gestió	Sotmès a aprofitament forestal, atesa la seva productivitat relativament elevada, si més no a les parts baixes i mitjanes de la seva franja altitudinal. També s'hi du a terme recol·lecció de bolets comestibles. Una part d'aquests boscos estan força malmesos, tot i que de manera natural es regeneren força fàcilment.		
HIC	9430 Boscos de pi negre (<i>Pinus uncinata</i>)		

Bosc de pi negre (<i>Pinus uncinata</i>) generalment amb neret (<i>Rhododendron ferrugineum</i>), acidòfils i mesòfils, dels obacs pirinencs			
Codi CORINE	42.413	Codi CHC	42f
Superfície (ha)	97807,8	Percentatge	0,25%
Aspecte	Bosc amb dominància de pi negre. En estat de desenvolupament òptim, els arbres són alts i creixen espessos, però rarament aquests bosc resulten gaire ombrívols, a causa de la forma llarga i estreta de les capçades dels pins. En general comprenen, a banda del dosser arbori, tres altres estrats poc o molt diferenciats: un d'arbustiu alt, dominat pel neret; un d'arbustiu baix, format essencialment per la nabinera; i un d'inferior, amb plantes herbàcies, líquens i molses. Aquestes darreres solen fer tapisos extensos. A les zones més elevades, aquest bosc pot esdevenir, de manera natural, poc o molt esclarissat i establir un trànsit gradual vers els neretars.		
Ecologia	biogeogràfiques : Estatge subalpí (rarament a l'altimontà). Ambients que ocupa : Típicament vessants obacs, amb bona innivació. En el paisatge actual, només en alguns vessants poc explotats aquesta pineda ateny realment el seu límit natural superior; en general, la pressió de la pastura l'ha expulsat de les parts més altes. Clima :Subalpí. Substrat i sòl : Sempre terrenys àcids (o sòls acidificats).		
Flora principal	Estrat arbori <i>Pinus uncinata</i> (Pi negre) Estrat arbustiu <i>Rhododendron ferrugineum</i> (neret), <i>Vaccinium myrtillus</i> (nabinera) Estrat herbaci <i>Pyrola sp.</i>		
Gestió	Sotmès a aprofitament forestal, atesa la seva productivitat relativament elevada, si més no a les parts baixes i mitjanes de la seva franja altitudinal. També s'hi du a terme recol·lecció de bolets comestibles. Una part d'aquests bosc estan força malmesos, tot i que de manera natural es regeneren força fàcilment.		
HIC	9430 Bosc de pi negre (<i>Pinus uncinata</i>)		

Pinedes de pi negre (<i>Pinus uncinata</i>), calcícoles i xeròfiles, dels solells pirinencs			
Codi CORINE	42.4242	Codi CHC	42h
Superfície (ha)	974003,3	Percentatge	2,45%
Aspecte	Bosc de pi negre de natural poc densos. A les zones més elevades, i especialment als indrets més rocosos, poden tenir l'aspecte de matollars arbrats. Típicament comprenen un estrat herbaci ben desenvolupat i amb força plantes pradenques. De vegades hi ha un estrat arbustiu important.		
Ecologia	Àrees biogeogràfiques : Estatge subalpí (i altimontà). Aquest hàbitat fa el límit superior del bosc a bona part dels Pirineus. De manera natural, pot pujar fins als 2.400-2.500 m d'altitud. Ambients que ocupa : Típicament vessants solells. Clima :Subalpí. Substrat i sòl : Substrat calcinal; sòls sovint poc desenvolupats i pedregosos.		
Flora principal	Estrat arbori <i>Pinus uncinata</i> Estrat arbustiu <i>Rhamnus alpina</i> (púdol), <i>Cotoneaster integerrimus</i> (cornera) Estrat herbaci <i>Festuca gautieri</i> (ussona)		
Gestió	Sotmès a aprofitament forestal. A causa de talls excessives i d'incendis ha esdevingut, en grans extensions, un bosc molt esclarissat i molt mal estructurat. Caldria actuar amb prudència a l'hora de fer-hi tallades o altres menes d'intervencions, ja que es regenera lentament. La seva extensió actual és relativament petita, sobretot comparada amb la que podria ocupar teòricament		
HIC	9430 Bosc de pi negre (<i>Pinus uncinata</i>)		

Pinedes de pi negre (<i>Pinus uncinata</i>), calcícoles i mesòfiles, dels obacs pirinencs			
Codi CORINE	42.425	Codi CHC	42i
Superfície (ha)-	2375533,6	Percentatge	5,98
Aspecte	Pinedes de pi negre gairebé sense estrat arbustiu i amb un estrat herbaci en què abunden diverses plantes pròpies dels prats calcícoles i mesòfils subalpins. L'estrat muscinal no hi sol manca, tot i que no acostuma a atènyer un recobriment important. També s'hi fan algunes espècies de roca o de pedrusca, a causa del substrat sovint pedregós.		
Ecologia	Àrees biogeogràfiques: Estatge subalpí (i altimontà). Aquesta pineda fa el límit superior forestal a bona part dels Pirineus. Ambients que ocupa : Típicament vessants obacs, pendents, i ben innivats. Clima: Subalpí. Substrat i sòl: Sempre terrenys calcinals. Sòls poc o molt pedregosos, a claps parcialment descalcificats.		
Flora principal	Estrat arbori <i>Pinus uncinata</i> Estrat arbustiu <i>Buxus sempervirens</i> Estrat herbaci <i>Sesleria caerulea</i>, <i>Pulsatilla alpina</i> subsp <i>font-queri</i> (flor del vent)		
HIC	9430 Boscos de pi negre (<i>Pinus uncinata</i>)		

Pinedes de pi negre (<i>Pinus uncinata</i>), o repoblacions, sense sotabosc forestal			
Codi CORINE	42.43	Codi CHC	42j
Superfície (ha)	579894,2	Percentatge	1,46
Aspecte	Arbredes de pi negre, producte de repoblació o originades per regeneració natural, amb un sotabosc dominat per herbes de caràcter no forestal. En alguns casos, poden ser força semblants, per l'aspecte, a les pinedes xeròfiles		
Ecologia	Àrees biogeogràfiques: Estatges subalpí i altimontà. Ambients que ocupa: Indrets i ambients molt diversos. Clima : Subalpí. Substrat i sòl: Diversos.		
Flora principal	Estrat arbori <i>Pinus uncinata</i> (eventualment barrejat amb <i>Pinus sylvestris</i> i amb híbrids entre aquests dos pins)		
Gestió	Sovint correspon a plantacions, que tenen per finalitat repoblar àrees poc aprofitades, establir vessants o accelerar la regeneració de boscos talats. Altres vegades es tracta de prats envaïts per arbres, a conseqüència d'una pressió pastoral moderada, malgrat que l'acció continuada dels ramats impedeixi la constitució d'un bosc veritable. La taxa de creixement dels arbres és molt diversa, segons els casos.		

Pinedes de pi roig (<i>Pinus sylvestris</i>), calcícoles i mesòfiles, dels obacs de l'estatge montà dels Pirineus			
Codi CORINE	42.561	Codi CHC	42k
Superfície (ha)	2527039,8	Percentatge	6,36%
Aspecte	Pinedes de pi roig, força denses quan són ben constituïdes. Comprenen un estrat arbori dominat absolutament pel pi i un sotabosc amb abundància variable de boix i d'algunes altres plantes típiques més aviat de les rouredes. L'estrat muscinal no hi sol manca, tot i que en general és poc important. De vegades, s'hi fan algunes plantes humícoles o dels boscos de coníferes acidificats.		
Ecologia	Àrees biogeogràfiques : Muntanya mitjana: estatge montà. Ambients que ocupa:Vessants obacs. Clima : Medieuropeu submediterrani. Substrat i sòl : Substrat calcinal. Sòls bàsics, de vegades ambclaps acidificats superficialment.		
Flora principal	Estrat arbori	<i>Pinus sylvestris</i> (pi roig)	
	Estrat arbustiu	<i>Buxus sempervirens</i> (boix), <i>Amelanchier ovalis</i> (corner), <i>Juniperus communis</i> (ginebre)	
	Estrat herbaci	<i>Festuca gautieri</i> (ussona)	
Gestió	Sotmès a aprofitament forestal.		

Pinedes de pi roig (<i>Pinus sylvestris</i>), calcícoles i xeròfiles, dels Pirineus			
Codi CORINE	42,5921*	Codi CHC	42m
Superfície (ha)	698644,1	Percentatge	17,6
Aspecte	Pinedes de pi roig, generalment poc denses, amb un sotabosc relativament pobre. A banda de la boixerola, la majoria d'arbustos que s'hi fan els comparteixen amb les rouredes. A l'estrat inferior, hi creixen diverses plantes pradenques		
Ecologia	Àrees biogeogràfiques: Muntanya mitjana: estatge montà. Ambients que ocupa : Vessants solells, on aquestes pinedes representen un tipus de bosc primari. Clima : Medieuropeu submediterrani. Substrat i sòl : Substrat calcinal; sòls sovint molt pedregosos.		
Flora principal	Estrat arbori	<i>Pinus sylvestris</i>	
	Estrat arbustiu	<i>Buxus sempervirens</i> (boix), <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (boixerola)	
	Estrat herbaci	<i>Festuca gautieri</i> (ussona) , <i>Teucrium pyrenaicum</i> (angelins) , <i>Carex humilis</i>	
Gestió	Es tracta d'un tipus de bosc molt sec, que es regenera amb dificultat després de les tales.		

Pinedes de pi roig (<i>Pinus sylvestris</i>), o repoblacions, sense sotabosc forestal			
Codi CORINE	42.5E	Codi CHC	42r
Superfície (ha)	1911806,5	Percentatge	4,82%
Aspecte	Arbredes de pi roig, amb el sotabosc dominat per herbes de caràcter no forestal, pròpies de les pastures properes. Es tracta d'arbredes naturals o bé de masses forestals procedents de repoblació; en aquest darrer cas, els pins solen estar clarament afilerats.		
Ecologia	Àrees biogeogràfiques :Muntanya mitjana i muntanya mediterrània. Ambients que ocupa :Qualsevol ambient poc humit. Clima : Medieuropeu o mediterrani muntanyenc. Substrat i sòl : Qualsevol.		
Flora principal	Estrat arbori	<i>Pinus sylvestris</i>	
Gestió	Sotmès a aprofitament forestal, sobretot en el cas de les repoblacions. De vegades es tracta de pastures envaïdes pels pins, que es continuen pasturant amb una certa intensitat.		

Boscos mixtos de faig (<i>Fagus sylvatica</i>) i avet (<i>Abies alba</i>), higròfils, pirinencs			
Codi CORINE	43141	Codi CHC	43a
Superfície (ha)	1363182	Percentatge	3,43
Aspecte	Boscos estretament relacionats amb les fagedes, constituïts per un estrat arbori en què hi ha faig i avet, i un sotabosc format per plantes clarament nemorals.		
Ecologia	Àrees biogeogràfiques : Muntanya mitjana: estatge altimontà. Ambients que ocupa : Vessants obacs, frescos i humits. Clima : Medieuropeu subatlàntic. Substrat i sòl : Substrats calcinals; sòls eutròfics i humífers.		
Flora principal	Estrat arbori	Abies alba (avet), Fagus sylvatica (faig)	
	Estrat herbaci	Scilla lilio-hyacinthus (joliu), Galium odoratum (espunyidella d'olor), Helleborus viridis subsp. Occidentalis (el-lèbor verd)	
Gestió	Boscos força productius, sotmesos a explotació forestal		
HIC	9130 Fagedes neutròfiles		

Boscots mixtos de roure martinenc (<i>Quercus pubescens</i>) i pi roig (<i>Pinus sylvestris</i>), calcícoles, de la muntanya mitjana			
Codi CORINE	43.7131*	Codi CHC	43D
Superfície (ha)	709755,9	Percentatge	1,79
Aspecte	Boscots amb un estrat arbori en què es barregen el pi roig i el roure martinenc (o algun dels seus híbrids) en diferents proporcions. L'estrat arbustiu sol ser força divers i en general està força desenvolupat		
Ecologia	Àrees biogeogràfiques – Muntanya mitjana: estatge submontà. Ambients que ocupa – Indrets diversos. Clima – Medieuropeu submediterrani. Substrat i sòl – Substrat calcinal. Sòls carbonatats, bàsics o molt poc àcids.		
Sintaxon	<i>Buxo sempervirentis-Quercetum pubescentis</i> Br. Bl. (1915) 1932		
Flora principal	Estrat arbori	<i>Pinus sylvestris</i> (pi roig), <i>Quercus pubescens</i> (roure martinenc) , <i>Quercus x subpyrenaica</i>	
	Estrat arbustiu	<i>Buxus sempervirens</i> (boix)	
	Estrat herbaci	<i>Hepatica nobilis</i> (herba fetgera), <i>Viola sylvestris</i> (viola)	
Gestió	Sotmès a aprofitament forestal i a pastura.		

TARTERES

Terrers calcaris, generalment margosos o bé guixencs, amb vegetació molt esparsa o quasi nus

Codi CORINE	61,51*	Codi CHC	61F
Superfície (ha)	1880790,2	Percentatge	4,74
Aspecte	Àrees erosionades, generalment molt pendents, sense vegetació o amb vegetació molt esparsa. Si l'erosió ve de molt antic, poden correspondre a vessants de petits pujols al mig d'una plana, com a testimoni del relleu desaparegut. <i>Badland</i> és el terme que utilitzen els geomorfòlegs per designar aquests aixaragallaments generalitzats, en què se solen diferenciar una zona d'erosió molt activa, sense plantes, un canal de transport, igualment nu, i una zona basal (tàlveg) amb deposició de materials on creixen sobretot herbes i algunes mates o arbustos.		
Ecologia	Àrees biogeogràfiques: Muntanya mitjana: estatge montà. Terra baixa: contrades mediterrànies interiors. Muntanya mediterrània. Ambients que ocupa : Marges de barrancs, especialment fons de vall i parts baixes dels vessants. Clima : Medieuropeu submediterrani o mediterrani. Els episodis de precipitació torrencial i l'acusada amplitud tèrmica diària i estacional són decisius per al manteniment d'aquest hàbitat. Substrat i sòl : Especialment lutites, fàcils d'alterar superficialment per acció física. Sòl inexistent o reduït als primers estadis de l'edafogènesi.		
Gestió	No és clara la manera com s'origina aquesta mena d'hàbitat, però de segur que les accions erosives, com el pas del ramats, la sobrepastura, l'incendi... ajuden a mantenir-lo i, fins i tot, a expandir-lo si les condicions ambientals són favorables.		

ANNEX III: DESCRIPCIÓ DELS MODELS DE COMBUSTIBILITAT I INFLAMABILITAT:

MODELS DE COMBUSTIBILITAT

Taula III.1: Models de combustibilitat.

Model	Superfície (ha)	%	Descripció	Quantitat combustible (Mg/ha)	Comportament del foc
1	715,2	19,18	Pastura fina, seca i baixa. <1/3 de recobriment de plantes llenyoses.	1-2	El foc es propaga per l'herba i es mou a gran velocitat.
2	263,8	7,07	Pastura fina, seca i baixa. 1/3 - 2/3 de recobriment de plantes llenyoses	5-10	Propagació per l'herba i es mou a gran velocitat.
4	182,5	4,89	Matollar o plantació jove molt densa (>2 m d'altura) amb branques seques a l'interior.	25-30	Focs ràpids i intensos que es propaguen per les capçades del matollar
5	1186	31,8	Matollar dens i verd (< 1 m d'altura)	5-8	El foc es propaga pel sòl cremant la fullaraca i la pastura. Focs poc intensos.
6	1018,2	27,3	Matollar. Semblant al model 5 però amb espècies més inflamables o amb restes de tallades i amb plantes més altes.	10-15	El foc es propaga pel matollar (més inflamable) amb vents moderats. Si no hi ha vent el foc pot baixar a ran de terra.
8	110,2	2,95	Bosc dens sense matollar. Fullaraca molt compacta	10-12	Propagació del foc per la fullaraca molt compacta. Focs superficials i amb alçades de flama baixes.
Improductiu natural	201,8	5,41			
Improductiu artificial	51,8	1,39			

Font: Elaboració pròpia a partir del CREAM, DARP-DMA

MODELS D'INFLAMABILITAT

Taula III.2: Descripció dels models d'inflamabilitat

Model	Superfície (ha)	%	Descripció
0	1502,8	40,29	FCC del 0 al 9% d'espècies molt inflamables: Formacions generalment herbàcies i humides, on la propagació del foc seria gairebé nul·la en cas de produir-se un incendi.
1	253	6,78	FCC del 10 al 19% d'espècies molt inflamables
2	127,2	3,41	FCC del 20 al 29% d'espècies molt inflamables
3	104,8	2,81	FCC del 30 al 39% d'espècies molt inflamables
4	112,5	3,02	FCC del 40 al 49% d'espècies molt inflamables
5	747,8	20,05	FCC del 50 al 59% d'espècies molt inflamables
6	114,8	3,88	FCC del 60 al 69% d'espècies molt inflamables
7	406,5	10,9	FCC del 70 al 79% d'espècies molt inflamables
8	74,2	1,99	FCC del 80 al 89% d'espècies molt inflamables
9	2,5	0,07	FCC del 90 al 99% d'espècies molt inflamables
18	201,8	5,41	
19	51,8	1,39	

Font: Elaboració pròpia a partir de bases descriptives del CREA