

DOCUMENTO DE CONSENSO

Evidencia y experiencia de bótox en migraña crónica: Recomendaciones para la práctica clínica diaria



A.B. Gago-Veiga^a, S. Santos-Lasaosa^b, M.L. Cuadrado^{c,d}, Á.L. Guerrero^e, P. Irimia^f,
J.M. Láinez^g, R. Leira^h, J. Pascualⁱ, M. Sanchez del Río^j, J. Viguera^k y P. Pozo-Rosich^{k,l,*}

^a Unidad de Cefaleas, Servicio de Neurología, Hospital Universitario La Princesa, Instituto de Investigación Sanitaria Princesa, Madrid, España

^b Unidad de Cefalea, Servicio de Neurología, Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza, España

^c Unidad de Cefaleas, Servicio de Neurología, Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España

^d Departamento de Medicina, Facultad de Medicina, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España

^e Unidad de Cefaleas, Servicio de Neurología, Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid, España

^f Departamento de Neurología, Clínica Universidad de Navarra

^g Servicio de Neurología, Hospital Clínico Universitario, Departamento de Neurología, Universidad Católica de Valencia, Valencia, España

^h Servicio de Neurología, Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España

ⁱ Hospital Universitario Marqués de Valdecilla e IDIVAL, Santander10, Programa de Cefaleas, Servicio de Neurología, Hospital Ruber Internacional, Madrid, España

^j Consulta de Cefalea, Servicio de Neurología, Unidad de Gestión Clínica de Neurociencias, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España

^k Unidad de Cefalea, Servicio de Neurología, Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona, España

^l Grupo de Investigación en Cefalea; VHIR; Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, España

Recibido el 31 de agosto de 2017; aceptado el 7 de septiembre de 2017

Accesible en línea el 21 de noviembre de 2017

PALABRAS CLAVE

Consenso;
Migraña crónica;
OnabotulinumtoxinA;
Toxina botulínica A;
Tratamiento
preventivo;
Recomendaciones

Resumen OnabotulinumtoxinA ha demostrado ser eficaz como tratamiento preventivo en pacientes con migraña crónica (MC). El Grupo de Estudio de Cefalea de la Sociedad Española de Neurología ha considerado que sería de interés, a los 5 años de la aprobación en España de la onabotulinumtoxinA, reunir a un grupo de expertos en el tratamiento de pacientes con MC para elaborar con la evidencia actual y nuestra experiencia unas recomendaciones dirigidas a facilitar su uso en la práctica clínica diaria. Con este fin planteamos 12 preguntas que nos hacen como médicos y que también nos realizan nuestros pacientes. Cada autor ha contestado

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: ppozo@vhebron.net (P. Pozo-Rosich).

KEYWORDS

Consensus;
Chronic migraine;
OnabotulinumtoxinA;
Botulinum neurotoxin
A;
Preventive
treatment;
Guidelines

una pregunta y luego el documento ha sido revisado por todos. Esperamos que esta revisión constituya una herramienta práctica para ayudar a los neurólogos que tratan a pacientes con MC.

© 2017 Sociedad Española de Neurología. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Este es un artículo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

**Evidence and experience with onabotulinumtoxinA in chronic migraine:
Recommendations for daily clinical practice**

Abstract OnabotulinumtoxinA has been demonstrated to be effective as a preventive treatment in patients with chronic migraine (CM). Five years after the approval of onabotulinumtoxinA in Spain, the Headache Study Group of the Spanish Society of Neurology considered it worthwhile to gather a group of experts in treating patients with CM in order to draw up, based on current evidence and our own experience, a series of guidelines aimed at facilitating the use of the drug in daily clinical practice. For this purpose, we posed 12 questions that we ask ourselves as doctors, and which we are also asked by our patients. Each author responded to one question, and the document was then reviewed by everyone. We hope that this review will constitute a practical tool to help neurologists treating patients with CM.

© 2017 Sociedad Española de Neurología. Published by Elsevier España, S.L.U. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

Introducción

Uno de los objetivos del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología (GECSEN) es elaborar documentos de consenso para establecer unas «guías de buena práctica clínica» a partir de la experiencia y la evidencia contrastada. El consenso sobre técnicas de infiltración anestésica en nervios pericraneales¹ fue nuestro primer trabajo y este documento tiene la intención de seguir en la misma línea. La elección de estos temas se ha basado, principalmente, en la falta de un claro «consenso» sobre cómo se debe aplicar y evaluar un tratamiento en la práctica clínica diaria.

Además, se ha tenido en cuenta la experiencia de aquellos neurólogos que, por trabajar en unidades de cefalea de referencia y haber demostrado a través de sus publicaciones interés en el tema que se trata, aportaran una información de lo que ocurre en la vida real una vez un tratamiento se pone en práctica tras ser aprobado después de la realización de ensayos clínicos.

El objetivo de este manuscrito es dar respuesta a las preguntas que los neurólogos se plantean a la hora de afrontar el manejo terapéutico con onabotulinumtoxin A (OnabotA) en los pacientes con migraña crónica (MC) con el objetivo final de poder ofrecerles el mejor tratamiento posible y así minimizar el impacto y la discapacidad que genera.

Metodología

Un grupo de neurólogos expertos en el manejo y tratamiento de pacientes con MC han trabajado en colaboración para contestar a partir de su experiencia y de la evidencia

publicada a las 12 preguntas que consideraron que son las que más influyen en el manejo terapéutico de los pacientes con MC tratados con OnabotA.

Los temas que se han tratado responden a 6 áreas de interés:

- 1) mecanismo de acción de OnabotA, 2) factores relacionados con la respuesta al tratamiento con OnabotA, 3) dosificación de OnabotA y tratamiento coadyuvante, 4) coste-efectividad del tratamiento con OnabotA, 5) seguridad del tratamiento con OnabotA e 6) información dirigida al paciente.

Se realizó una revisión de la literatura en la base de datos MEDLINE mediante el proveedor *Pubmed*, que incluyó los diferentes artículos publicados hasta abril de 2017. Esta búsqueda bibliográfica se complementó con las listas de referencias obtenidas de los artículos seleccionados, bases de datos de organizaciones y de las sociedades de Neurología y de las guías de práctica clínica de referencia.

Cada neurólogo ha contestado una pregunta. Esta contestación ha sido revisada críticamente y de forma ciega por otro experto y después todos revisaron de forma conjunta el documento final.

1. ¿Cuál es el mecanismo de acción de onabotulinumtoxinA?

OnabotA (Botox[®]) es una de las formas de toxina botulínica de tipo A (BoNTA), perteneciente a la gran familia de neurotoxinas sintetizadas por la bacteria *Clostridium botulinum*. Se trata de una proteína compuesta por 2 cadenas polipeptídicas, una pesada y una ligera, que permanecen unidas por un puente disulfuro^{2,3}. Al entrar en contacto con las terminaciones nerviosas presinápticas, la cadena pesada se une a receptores de membrana y el complejo toxina-receptor

se integra en la neurona mediante un proceso de endocitosis. A continuación, se produce un cambio de conformación de la proteína, se rompe el enlace disulfuro y la cadena ligera se libera hacia el citoplasma neuronal^{3,4}. Tras pasar al citoplasma, la cadena ligera interacciona con el complejo SNARE (del inglés, *Soluble N-ethylmaleimide-sensitive factor Attachment protein REceptor*). Este complejo está formado por un grupo de proteínas vesiculares y de membrana, y permite la fusión de las vesículas sinápticas con la membrana sináptica. Concretamente la BoNTA escinde la proteína *SyNaptosomal Associated Protein-25* (SNAP-25), una proteína esencial del complejo SNARE que está anclada en la cara interna de la membrana plasmática⁵. Al dañar el complejo SNARE, la toxina impide la exocitosis de neurotransmisores y neuropéptidos desde las terminaciones nerviosas hacia la hendidura sináptica³.

El efecto más conocido de OnabotA es su capacidad de inhibir la liberación de acetilcolina en la placa motora. Este efecto se ha aprovechado extensamente para tratar procesos neurológicos caracterizados por hiperactividad muscular. OnabotA también bloquea la liberación de acetilcolina desde las terminaciones nerviosas del sistema nervioso vegetativo, lo que justifica su aplicación en determinados cuadros de disfunción autonómica^{4,6}. En los últimos años las indicaciones terapéuticas de OnabotA se han extendido al campo del dolor, al haber demostrado eficacia clínica en la MC y en otros síndromes dolorosos. También en el ámbito experimental se ha podido demostrar que la BoNTA interfiere en la transmisión de los estímulos de dolor^{7,9}.

El mecanismo exacto por el cual OnabotA tiene un efecto antinociceptivo no se ha aclarado por completo. En cultivos celulares y en el animal de laboratorio se ha comprobado que la BoNTA bloquea la liberación periférica de neuropéptidos implicados en la inflamación neurogénica, como la sustancia P^{10,11} y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP)^{11,12}, y de neurotransmisores excitadores como el glutamato^{13,14}. También es capaz de bloquear la translocación de receptores de membrana hacia la superficie de las neuronas sensitivas, como el receptor vaniloide *transient receptor potential vanilloid 1* (TRPV1)¹⁵⁻¹⁷ o el receptor purinérgico P2X3¹⁶. Por todos estos mecanismos, la BoNTA podría disminuir la sensibilización de las terminaciones nerviosas periféricas e, indirectamente, la sensibilización central¹⁸. Este parece ser el fundamento de la aplicación de infiltraciones pericraneales de OnabotA en el tratamiento de la MC. De hecho, en el protocolo Phase III Research Evaluating Migraine Prophylaxis Therapy (PREEMPT III) los puntos de infiltración se sitúan próximos a los nervios peritracraneales que dirigen sus aferencias hacia el núcleo espinal del trigémino¹⁹. Además, algunos trabajos experimentales señalan que la BoNTA podría modular directamente las señales de los nociceptores meníngeos a través de ramas nerviosas colaterales que atraviesan las suturas del cráneo^{20,21}. Independientemente de sus efectos periféricos, en condiciones experimentales con dosis altas, BoNTA podría llegar a alcanzar el sistema nervioso central por transporte axónico retrógrado y por transferencia interneuronal²². Sin embargo, en el animal de experimentación solo se han detectado fragmentos de escisión de la proteína SNAP-25 en las neuronas más periféricas, por lo que resulta poco probable que las infiltraciones de BoNTA tengan efectos relevantes a nivel central²³.

2. ¿Cuáles son los factores predictores de la respuesta a onabotulinumtoxinA?

Desde el inicio de la investigación de OnabotA como posible tratamiento en MC, múltiples grupos de investigación han buscado factores predictores de respuesta a dicho tratamiento. Para su análisis se propone la siguiente clasificación:

Clínico/demográficos

Diferentes variables clínicas se han propuesto como posibles predictores de la respuesta a OnabotA; entre ellos, la cefalea con una marcada unilateralidad o alodinia²⁴, la cefalea ocular o implosiva²⁵ o la presencia en la exploración de sensibilidad pericraneal²⁶, que no han sido confirmados en estudios posteriores²⁷. Se ha indicado que un menor tiempo de evolución de la migraña²⁸ o de la situación de cronicidad²⁹ se relacionaría con una mejor respuesta.

Analíticos

Se ha publicado que los niveles de CGRP y, en menor medida, del VIP, podrían predecir la respuesta a OnabotA en pacientes con MC³⁰.

Neuroradiológicos

En el campo de la neurosonología, se ha encontrado que la ratio entre la velocidad —medida en un doppler transcraneal interictal— de la arteria cerebral media y la carótida interna ipsilateral, era significativamente mayor en los respondedores³¹.

Un trabajo publicado por el grupo de Borsook identifica cambios estructurales y funcionales en estudios en estado de reposo (*resting-state*), que se presentan de forma diferente entre respondedores y no respondedores³². El número de pacientes evaluados en este trabajo es reducido y habrá que esperar confirmación de sus resultados por otros grupos.

3. ¿Cuándo es el momento idóneo para iniciar tratamiento con onabotulinumtoxinA?

En España, OnabotA está aprobada desde el año 2012 como tratamiento preventivo de la MC «en pacientes que no han respondido adecuadamente o son intolerantes a los medicamentos preventivos de la migraña». En la *Guía oficial de práctica clínica en cefaleas* del GECSEN del año 2015³³ se propone, tras la publicación de los estudios PREEMPT^{34,35}, iniciar dicho tratamiento en pacientes con intolerancia, contraindicación o falta de respuesta a al menos 2 fármacos preventivos (un β-bloqueante y topiramato) que se habrán utilizado a las dosis mínimas recomendadas y durante al menos 3 meses³⁶ (nivel de evidencia IV, grado de recomendación GECSEN) (fig. 1).

Cada vez existen más pruebas que señalan que un menor tiempo de evolución de la migraña, en general^{28,31}, y de la MC, en particular³⁷, se asocian con una evolución favorable y mejor respuesta al tratamiento con OnabotA, por lo que se recomienda iniciar el tratamiento preventivo de manera precoz³⁸.




Figura 1 Algoritmo terapéutico de tratamiento inicial de un paciente con migraña crónica.

Tabla 1 Criterios de respuesta en el tratamiento con OnabotA en migraña crónica

Variables objetivas	
Primarias	Reducción del n.º de días de cefalea y del n.º de días de migraña al mes Reducción en intensidad de dolor Reducción en el número de días de uso y número de dosis de analgésicos Mejoría en las escalas de discapacidad (MIDAS) e impacto (HIT-6) de la cefalea Presencia/ausencia de efectos secundarios
Secundarias	Reducción del coste fármaco-económico: directo (por enfermedad) e indirecto (pérdida de productividad)
Variable subjetiva	Decisión del paciente de seguir o no con el tratamiento

4. ¿Cómo evaluar la respuesta a onabotulinumtoxinA?

Evaluar la respuesta de un paciente al tratamiento con OnabotA requiere tener en consideración no solo variables objetivas, funcionales y operativas sino también variables subjetivas. Las primeras se cuantifican mediante un calendario en el que se marcan los días con dolor y los días de incapacidad, y ayudan al neurólogo a decidir, conjuntamente con el paciente, la respuesta al tratamiento³⁹.

Las variables subjetivas serían la intensidad de la cefalea, la tolerabilidad y la valoración global de continuar o no con el tratamiento⁴⁰. En la tabla 1 se muestra una relación de las principales variables objetivas y subjetivas.

5. Si no hay respuesta al inicio, ¿cuántos ciclos de onabotulinumtoxinA hay que intentar?

A partir de los datos del programa PREEMPT⁴⁰, sabemos que aproximadamente un 15% de los pacientes (dependiendo de la medida de eficacia que usemos) inicia su respuesta clínica en el segundo ciclo de tratamiento. De esta forma, en ausencia de una aparente respuesta al ciclo




Figura 2 Porcentaje de respondedores (mejoría ≥ 50% respecto a la situación basal en el número de días de cefalea) con cada ciclo de tratamiento.

initial, se deberá, obligatoriamente, administrar un segundo ciclo, considerando la posibilidad de incrementar la dosis a 195 U. Estos resultados, por un lado, son esperables teniendo en cuenta la intrínseca variabilidad de la MC —que puede hacer que una aparente falta de respuesta a un ciclo no sea tal— y, por otro, indican que el efecto de OnabotA, al menos en los primeros ciclos de tratamiento, es acumulativo.

El análisis *post hoc* de los pacientes incluidos en el estudio PREEMPT aclara que un tercer ciclo del tratamiento consigue rescatar hasta un 10% de los pacientes aparentemente refractarios⁴¹ (fig. 2). Por tanto, según los datos de este trabajo, que son congruentes con la práctica clínica habitual, aun cuando no se objetive una respuesta satisfactoria a las 24 semanas, es recomendable infiltrar OnabotA al menos una tercera vez, incrementando la dosis a 195 U⁴², antes de establecer la ausencia de respuesta a este tratamiento (nivel de evidencia IV, grado de recomendación GECSEN)³³.

6. ¿Cuándo administrar más de 155 U de onabotulinumtoxinA?

La recomendación de la dosis actual de 155-195 U procede de los datos que se han ido acumulando en los diferentes ensayos clínicos realizados con OnabotA en el tratamiento de la migraña^{43,44}. Estudios con dosis más elevadas (225-260 U) que no seguían el paradigma de inyección PREEMPT —si bien no consiguieron el objetivo primario de eficacia— permitieron demostrar la seguridad de dosis más altas^{45,46}.

En los estudios PREEMPT^{34,35} se utilizó una dosis inicial de 155 U administrada en puntos fijos. Se contemplaba la posibilidad de utilizar, a elección del investigador y en función de la localización del dolor, una dosis adicional de 40 U en la zona temporal, occipital o del trapecio hasta una dosis máxima de 195 U. En la práctica clínica no se han realizado estudios comparativos entre las diferentes dosis, si bien la mayoría de los autores proponen utilizar dosis más altas en los pacientes que son refractarios a dosis iniciales bajas⁴⁷.

Un reciente estudio ha demostrado la eficacia mantenida durante los 2 años de seguimiento de la dosis de 195 U en 143 pacientes con MC y uso excesivo de fármacos⁴². Comparada con una cohorte histórica tratada con 155 U, la respuesta a 195 U fue superior, desde el primer ciclo, en el número de días con cefalea, número de días con migraña y puntuación en el HIT-6. La diferencia en el consumo de medicación sintomática para la migraña no fue significativa hasta el cuarto ciclo⁴².




Figura 3 Manejo del paciente con tratamiento preventivo oral.

Fruto de los datos publicados y de la experiencia clínica, hay 2 razones para recomendar subir la dosis tras una primera sesión: la ausencia de respuesta o una respuesta insuficiente ante una primera infiltración, o bien una duración insuficiente de dicha respuesta, con un empeoramiento a las 8-10 semanas tras una buena respuesta inicial.

7. ¿Cómo manejar el tratamiento preventivo oral en pacientes con onabotulinumtoxinA?

En la práctica clínica es relativamente habitual mantener la prevención oral, aunque la respuesta no sea óptima, cuando iniciamos el tratamiento con OnabotA^{48,49}. La respuesta tras un primer o segundo ciclo puede permitir la retirada o bajada de dosis de esos otros fármacos preventivos orales. Según la evidencia disponible, ello se logra en más de la mitad de los pacientes (en el 45,2% de forma completa y en el 13,9% de forma parcial)⁴⁹.

Dos son las situaciones de partida al iniciar tratamiento con OnabotA:

- Paciente sin tratamiento preventivo oral por intolerancia, contraindicación o ausencia de respuesta tras, al menos, 6 semanas de tratamiento.
- Paciente en tratamiento preventivo oral en monoterapia o terapia combinada, con respuesta parcial.

El protocolo de retirada de tratamiento preventivo oral queda reflejado en la figura 3. Se ha de tener en cuenta, además:

- La opinión y consentimiento del paciente.
- Si existe un empeoramiento, se recomienda volver a la dosis previa.
- En el supuesto de terapia combinada, ante igualdad de eficacia y tolerabilidad, se mantendrá topiramato.
- El tratamiento preventivo puede estar indicado para el tratamiento de enfermedades concomitantes.

8. ¿Existe un efecto acumulativo de respuesta a onabotulinumtoxinA?

De acuerdo con la evidencia publicada, todavía es difícil predecir cuándo un paciente alcanzará un máximo de respuesta con el tratamiento con OnabotA. Los resultados del estudio PREEMPT y de las series de práctica clínica⁵⁰⁻⁵³ indican que la reducción en el número de días de cefalea, intensidad y consumo de analgésicos podría ser progresiva hasta el cuarto ciclo.

Sin embargo, dichos estudios no son directamente comparables, ya que la medición de la respuesta varía. Los resultados del estudio PREEMPT⁵⁴ muestran que los pacientes continuaban mejorando desde el inicio con el tratamiento con OnabotA, al menos durante el tiempo de seguimiento del estudio. El estudio REPOSE⁵², con un diseño observacional, multicéntrico y prospectivo, registró datos de 783 pacientes con MC tratados con OnabotA durante un año. Se concluyó que la eficacia, en términos de reducción del número de días de cefalea y de mejora de la calidad de vida, se mantenía a lo largo del año de seguimiento. Si bien las diferencias se calcularon desde el valor inicial, parecían incrementarse de forma progresiva en las primeras 4 visitas.

Guerzoni et al.⁵⁰ publicaron un estudio prospectivo que siguió durante 18 meses a 57 pacientes con MC tratados con OnabotA. El número de días de cefalea o migraña al mes se redujo de forma significativa y progresiva, comparados con el valor inicial. A los 6 meses del comienzo del tratamiento, la disminución en el número de días de dolor fue del 22% y, de manera consistente, se redujo un 18% adicional tras cada tratamiento. El consumo de analgésicos disminuyó un 26% a los 6 meses y un 67% a los 18 meses.

El estudio COMPEL es un estudio observacional, prospectivo, multicéntrico y abierto que incluyó a 715 pacientes tratados con OnabotA⁵¹. El seguimiento fue de 108 semanas y 9 ciclos de tratamiento. Los autores concluyeron que la eficacia observada fue secuencial y que alcanzó su valor máximo tras el noveno ciclo con respecto al inicio.

Negro et al.⁵³, en un estudio observacional y prospectivo, siguieron a 132 pacientes con MC durante 2 años. Observaron reducciones significativas, en comparación con los valores iniciales, desde el primer ciclo en todas las variables estudiadas (número de días de cefalea y de migraña al mes,

HIT-6), si bien este incremento en el beneficio fue menos llamativo después del primer año.

9. En el largo plazo ¿cómo se maneja a los respondedores?

Dado que la MC es una enfermedad de larga evolución, es lícito plantearse qué hacer con estos pacientes tras finalizar el primer año de tratamiento. No existe un consenso establecido en este punto, al no disponer de estudios controlados frente a placebo de más de un año de duración⁵⁵. Sin embargo, existen datos de práctica clínica de hasta 5 años de tratamiento que permiten aconsejar en este sentido.

Diversos trabajos no controlados han demostrado que, durante el primer año, alrededor del 70% de los pacientes responden objetiva (reducción de al menos un 50% en sus días de migraña en al menos 3 de 4 tratamientos) y subjetivamente a la OnabotA^{47,56-59}.

¿Puede suspenderse el tratamiento al final del primer año?

Los datos disponibles muestran que la mitad de los pacientes necesitan continuar con OnabotA trimestralmente, ya que a partir de las 12 semanas experimentan un empeoramiento sistemático. De la mitad restante, hasta un 40% puede posponer las inyecciones un mes (necesitarían OnabotA 3 veces al año) y el 10% restante no necesitaría continuar con las inyecciones⁴⁸.

¿Qué ocurre con la respuesta a partir del año?

En la práctica clínica se ha demostrado que tan solo uno de cada 10 pacientes que responden durante el primer año no lo hace durante el segundo⁴⁸. En el seguimiento a 5 años, la evidencia disponible indica que, a partir del segundo año, la pérdida de respuesta es excepcional. En esta misma serie ningún paciente dejó de responder a OnabotA entre el tercer y el quinto año de tratamiento. Los beneficios del tratamiento a largo plazo no se limitan al número de días sin dolor, sino que incluyen una reducción en el consumo de analgésicos y de visitas a Urgencias por cefalea grave de, al menos, un 50%^{48,60}.

La excelente tolerabilidad de OnabotA se mantiene a partir del año. La tasa de efectos adversos se sitúa por debajo del 20%, los abandonos por este motivo son excepcionales y el perfil no varía sobre el ya conocido en esta indicación a corto plazo, salvo por la posible presencia de atrofia muscular local, que nos debería llevar a disminuir la dosis en ese músculo en particular⁴⁸.

¿Qué hacer si en un momento determinado un paciente no responde a un ciclo?

La ausencia de respuesta puede ser aparente. Dado que la MC es una enfermedad que puede fluctuar y empeorar de forma cíclica, se ha propuesto como medida de respuesta la reducción >50% en al menos 3 de 4 tratamientos⁴⁸. Si hubiera una falta de respuesta o respuesta insuficiente, debería incrementarse la dosis de OnabotA a 195 U (ver pregunta 6)⁴².

10. OnabotulinumtoxinA en migraña crónica: ¿es realmente un tratamiento coste-efectivo?

Estudios recientes muestran que el coste de la MC oscila entre 1.500 y 3.700 € al año, y triplica al de la migraña episódica⁶¹. El coste directo de la MC es mayor porque los pacientes requieren más atención médica (en consulta externa, urgencias o en régimen de hospitalización) y más estudios complementarios para confirmar el diagnóstico. Además, en los pacientes con MC el coste indirecto derivado del absentismo laboral y de la pérdida de productividad, que representa más del 70% del coste global de la migraña, también se incrementa de forma significativa⁶². El control del gasto es uno de los ejes fundamentales de la política sanitaria, puesto que los recursos de los sistemas de salud son limitados⁶³. Por este motivo, los tratamientos que se van introduciendo en la práctica clínica deben ser eficaces, pero también coste-efectivos, sobre todo en enfermedades prevalentes, discapacitantes, con mucha comorbilidad asociada y de larga duración, como la MC^{63,64}.

Los primeros estudios económicos, basados en estimaciones, muestran que el tratamiento con OnabotA es coste-efectivo, al reducir tanto los costes directos como los indirectos^{65,66}, dato que se confirma en estudios posteriores de práctica clínica^{67,68}. Cuando se compara OnabotA con otros tratamientos preventivos orales, se observa que solo en los sujetos tratados con OnabotA disminuyen las visitas a urgencias o la necesidad de hospitalización⁶⁹. En España, diferentes publicaciones^{48,69} muestran que este tratamiento reduce el coste directo fundamentalmente por la disminución en el consumo de triptanes y de las visitas a urgencias.

En relación con el coste indirecto, el tratamiento con OnabotA se asocia a una marcada reducción de la discapacidad asociada a la migraña y mejora la calidad de vida de los pacientes⁴⁰. Por tanto, parece razonable concluir que el impacto del tratamiento va más allá de la disminución de los gastos directos y que, al mejorar la discapacidad, se reduce de forma paralela el coste indirecto asociado al absentismo y a la pérdida de productividad causado por la MC.

11. ¿Es onabotulinumtoxinA un tratamiento seguro?

En el análisis de la seguridad y tolerabilidad de OnabotA en los 5 ensayos que dieron lugar al desarrollo de su indicación en MC⁷⁰, la tasa de abandono del fármaco debido a efectos adversos fue de un 3,4%. Los problemas más frecuentes fueron dolor cervical (12,6%), debilidad muscular (8%) sensación de rigidez muscular (6,1%) y ptosis palpebral (4,6%). Aunque un 72,9% de los pacientes tratados con OnabotA describieron al menos un efecto adverso, en solo un 5,4% se consideró como importante, frente a un 3% en el grupo placebo.

En el programa PREEMPT solo un 34,8% de los pacientes experimentó algún efecto adverso relacionado con la medicación. En sesiones sucesivas, el porcentaje de pacientes con efectos adversos relacionados con la medicación disminuyó del 48,3% en la primera al 19,1% en la quinta sesión⁵⁴.

En el estudio de práctica clínica con mayor número de pacientes publicado hasta la fecha, los porcentajes de rigidez (14,5%) y ptosis palpebral (11%) fueron algo mayores que en los ensayos clínicos. Los autores de este trabajo

Tabla 2 Conclusiones**Mecanismo de acción en migraña crónica**

BoNTA bloquea la exocitosis de neuropéptidos y neurotransmisores implicados en la génesis y propagación de los impulsos de dolor (sustancia P, CGRP, glutamato), así como en la translocación de receptores de membrana hacia la superficie de las neuronas sensitivas (TRPV1, P2X3)

Predictores de respuesta

Los factores predictores de respuesta a OnabotA se relacionan con su mecanismo de acción de OnabotA (niveles en plasma de CGRP) y con parámetros que pueden implicar una pérdida de la capacidad de «de-cronificación» de la migraña (edad, tiempo de evolución y cambios estructurales o funcionales en neuroimagen)

Cuándo iniciar el tratamiento con OnabotA

Se debe iniciar de forma precoz el tratamiento con OnabotA en todos aquellos pacientes con MC que presenten ausencia de respuesta, intolerancia o contraindicación de 2 tratamientos preventivos orales

Variables de respuesta

Además de las variables objetivas y cuantitativas (disminución en el número de días de cefalea al mes, número de días de migraña al mes y número de días libres de dolor) es importante considerar variables subjetivas (decisión del paciente de continuar con el tratamiento)

Cuántos ciclos se deben intentar ante la ausencia inicial de respuesta

Aun cuando no se objetive una respuesta satisfactoria a las 24 semanas, es razonable completar 3 ciclos de tratamiento con OnabotA, incrementando la dosis a 195 U, antes de establecer su ineffectividad. Se deberá, así mismo, valorar la existencia de factores de cronificación, refractariedad, comorbilidades o coexistencia de otra fuente de dolor o cefalea primaria

Cuándo administrar más de 155 U de OnabotA

Es recomendable utilizar dosis de 195 U tras una primera infiltración en ausencia de respuesta, cuando esta es subóptima o insuficiente en el tiempo, con empeoramiento a las 8-10 semanas tras una buena respuesta inicial. Es importante valorar la existencia de escaso desarrollo de la musculatura cervical, por el mayor riesgo de efectos adversos

Cómo manejar el tratamiento preventivo oral en pacientes con OnabotA

Ante una mejoría mantenida >75%, se recomienda la retirada completa del tratamiento preventivo oral. Si la mejoría es del 50-75%, se intentará reducir la dosis en el caso de monoterapia o retirar uno de los 2 fármacos en caso de terapia combinada. En este último supuesto, en igualdad de eficacia y tolerabilidad, se mantendrá topiramato. Ante una mejoría < 50% se aconseja mantener la profilaxis oral

¿Existe un efecto acumulativo de OnabotA?

El efecto de OnabotA como tratamiento preventivo de la MC es acumulativo en los ciclos sucesivos, si bien todavía es difícil establecer un momento a partir del cual los pacientes alcanzan un beneficio máximo

Tabla 2 (continuación)**A largo plazo ¿cómo manejar a los respondedores?**

Tras un primer año de tratamiento, el 10% de los pacientes lo suspenderán por buena respuesta; en el 40% se podrá diferir un mes cada ciclo y aproximadamente la mitad continuará con ciclos trimestrales. La pérdida de respuesta tras el primer año es excepcional y, si ocurriera, se deberá incrementar la dosis a 195 U

OnabotA en migraña crónica: ¿es realmente un tratamiento coste-efectivo?

Sí. El tratamiento con OnabotA, confirmado en estudios de práctica clínica, reduce tanto los costes directos como los indirectos. Al ser un fármaco muy bien tolerado, no genera un consumo de recursos derivado de posibles efectos adversos, ya que son infrecuentes y leves

¿Es OnabotA un tratamiento seguro?

Sí. La retirada del tratamiento con OnabotA en MC por efectos adversos es infrecuente, si bien no disponemos de datos de seguimiento superior a 5 años

observaron ocasionalmente exacerbación de la cefalea durante los primeros días posteriores a la inyección (4,3%) y disfagia (1,96%)⁵⁹.

El grupo de trabajo de Pascual et al.⁴⁸ describió en 2 pacientes tratados durante más de 5 años atrofia muscular frontotemporal. En ambos casos se trató de una observación de los investigadores, sin repercusión funcional ni estética y sin necesidad de interrumpir el tratamiento. Finalmente, con relación a la dosis de 195 U, en el estudio de Negro et al.⁴² la tasa de efectos adversos fue similar en ambas cohortes (155 y 195 U).

12. ¿Cómo manejar las expectativas del paciente? ¿Cómo informar al paciente?

Para manejar correctamente las expectativas de estos pacientes ante el tratamiento con OnabotA deberemos responder a las siguientes cuestiones con la información que conocemos y que está resumida en este documento:

¿Cuánto y cuándo voy a mejorar?

El tratamiento con OnabotA, tanto en los ensayos clínicos como en la práctica real^{28,42,48,58,59,71-74}, ha demostrado una reducción del 50% en el número de días con cefalea y días de migraña al mes, así como una mejoría en la intensidad del dolor (días con consumo de medicación analgésica y número de dosis).

Alrededor del 80% de los pacientes responden a la infiltración de OnabotA durante y después del primer año de tratamiento^{38,42,48,58,71-75}. Esto permite, en algunos casos, ir retirando medicación preventiva a partir del tercer ciclo y suspenderla finalmente en casi la mitad de los pacientes⁴². Esta mejoría se observa también en escalas tanto de calidad de vida como de impacto de la cefalea, y se mantiene en el tiempo^{49,71}.

Compromiso terapéutico

Los estudios actuales señalan que un menor tiempo de evolución de la migraña en general^[28,76] y de la MC en particular, así como un tratamiento más precoz, se asocian con una mejor respuesta al tratamiento^[38]. Tras un primer ciclo con 155 U, deberemos plantear subir la dosis a 195 U cuando no hay respuesta, esta es subóptima o no se mantiene hasta el siguiente ciclo (empeoramiento a las 8-10 semanas tras una buena respuesta inicial)^[42,47].

¿Es un tratamiento seguro?

Sí. En los ensayos clínicos^[34,35] y en estudios de práctica clínica real^[52,59], los efectos secundarios son leves y transitorios: dolor cervical, debilidad muscular, sensación de rigidez muscular y ptosis palpebral. Así mismo, cuando se valoran los datos de seguridad a largo plazo^[48] y con dosis más altas^[42] los efectos adversos no difieren, lo que demuestra que el uso de OnabotA en MC es seguro y que la retirada del tratamiento como consecuencia de estos es anecdótica.

¿Durante cuánto tiempo y cada cuánto?

No existe un consenso sobre cuándo finalizar el tratamiento con OnabotA en el paciente respondedor. Sí sabemos que, en aproximadamente un 20% de los casos, el intervalo entre ciclos puede extenderse a 4 o 5 meses^[75]. De ello se deduce que el efecto de OnabotA es acumulativo en ciclos sucesivos, si bien es difícil hoy en día establecer un momento a partir del cual los pacientes alcanzan un beneficio máximo. La pérdida de respuesta tras el primer año de tratamiento es rara y si ocurre debemos considerar un incremento de dosis a 195 U. Una vez restablecida la respuesta, se podría readjustar la dosis atendiendo a las necesidades del paciente. Los datos de seguimiento a 5 años indican que la excelente tolerabilidad de OnabotA se mantiene en el tiempo^[48].

Conclusiones

Las conclusiones de este consenso, derivadas de las preguntas inicialmente planteadas y basadas en nuestra experiencia clínica y la evidencia publicada, aparecen reflejadas en la tabla 2.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Agradecimientos

Los autores desean agradecer a los Laboratorios Allergan su colaboración con la asistencia en la redacción médica y la logística de las reuniones.

Cabe señalar que Allergan S. A. no participó en la preparación del documento ni influyó de ninguna manera en las conclusiones alcanzadas.

La asistencia editorial en la preparación de este manuscrito fue proporcionada por el Dr. Antonio Martínez de

Ciencia y Deporte S. L. El apoyo para esta asistencia fue financiado por Allergan S. A.

Bibliografía

1. Santos Lasaosa S, Cuadrado Pérez ML, Guerrero Peral AL, Huerta Villanueva M, Porta-Etessam J, Pozo-Rosich P, et al. Guía consenso sobre la infiltración anestésica de nervios pericraneales. *Neurología*. 2017;32:316–30.
2. Simpson LL. The origin, structure, and pharmacological activity of botulinum toxin. *Pharmacol Rev*. 1981;33:155–88.
3. Kumar R, Dhaliwal HP, Kukreja RV, Singh BR. The botulinum toxin as a therapeutic agent: Molecular structure and mechanism of action in motor and sensory systems. *Semin Neurol*. 2016;36:10–9.
4. Grumelli C, Verderio C, Pozzi D, Rossetto O, Montecucco C, Matteoli M. Internalization and mechanism of action of clostridial toxins in neurons. *Neurotoxicology*. 2005;26:761–7.
5. Blasi J, Chapman ER, Link E, Binz T, Yamakasi S, de Camilli P, et al. Botulinum neurotoxin A selectively cleaves the synaptic protein SNAP-25. *Nature*. 1993;365:160–3.
6. Schantz EJ, Johnson EA. Botulinum toxin: The story of its development for the treatment of human disease. *Perspect Biol Med*. 1997;40:317–27.
7. Guo BL, Zheng CX, Sui BD, Li YQ, Wang YY, Yang YL. A closer look to botulinum neurotoxin type A-induced analgesia. *Toxicon*. 2013;71:134–9.
8. Oh HM, Chung ME. Botulinum toxin for neuropathic pain: A review of the literature. *Toxins*. 2015;7:3127–54.
9. Pellett S, Yaksh TL, Ramachandran R. Current status and future directions of botulinum neurotoxins for targeting pain processing. *Toxins*. 2015;7:4519–63.
10. Welch MK, Purkiss JR, Foster KA. Sensitivity of embryonic rat dorsal root ganglia neurons to *Clostridium botulinum* neurotoxins. *Toxicon*. 2000;38:245–58.
11. Lucioni A, Bales GT, Lotan TL, McGehee DS, Cook SP, Rapp DE. Botulinum toxin type A inhibits sensory neuropeptide release in rat bladder models of acute injury and chronic inflammation. *BJU Int*. 2008;101:366–70.
12. Durham PL, Cady R, Cady R. Regulation of calcitonin gene-related peptide secretion from trigeminal nerve cells by botulinum toxin type A: Implications for migraine therapy. *Headache*. 2004;44:35–42.
13. Cui M, Khanijou S, Rubino J, Aoki KR. Subcutaneous administration of botulinum toxin A reduces formalin-induced pain. *Pain*. 2004;107:125–33.
14. Aoki KR. Review of a proposed mechanism for the antinociceptive action of botulinum toxin type A. *Neurotoxicology*. 2005;26:785–93.
15. Morenilla-Palao C, Planells-Cases R, García-Sanz N, Ferrer-Montiel A. Regulated exocytosis contributes to protein kinase C potentiation of vanilloid receptor activity. *J Biol Chem*. 2004;279:25665–72.
16. Apostolidis A, Popat R, Yiagou Y, Cockayne D, Ford AP, Davis JB, et al. Decreased sensory receptors P2X3 and TRPV1 in suburothelial nerve fibers following intradetrusor injections of botulinum toxin for human detrusor overactivity. *J Urol*. 2005;174:977–83.
17. Shimizu T, Shibata M, Toriumi H, Iwashita T, Funakubo M, Sato H, et al. Reduction of TRPV1 expression in the trigeminal system by botulinum neurotoxin type-A. *Neurobiol Dis*. 2012;48:367–78.
18. Aurora SK, Brin MF. Chronic migraine: An update on physiology, imaging, and the mechanism of action of two available pharmacologic therapies. *Headache*. 2017;57:109–25.
19. Blumenfeld A, Silberstein SD, Dodick DW, Aurora SK, Turkel CC, Binder WJ. Method of injection of onabotulinumtoxinA for

- chronic migraine: A safe, well-tolerated, and effective treatment paradigm based on the preempt clinical program. *Headache*. 2010;50:1406–18.
20. Burstein R, Zhang X, Levy D, Aoki KR, Brin MF. Selective inhibition of meningeal nociceptors by botulinum neurotoxin type A: Therapeutic implications for migraine and other pains. *Cephalgia*. 2014;34:853–69.
 21. Zhang X, Strassman AM, Novack V, Brin MF, Burstein R. Extracranial injections of botulinum neurotoxin type A inhibit intracranial meningeal nociceptors' responses to stimulation of TRPV1 and TRPA1 channels: Are we getting closer to solving this puzzle? *Cephalgia*. 2016;36:875–86.
 22. Bomba-Warczak E, Vevea JD, Brittain JM, Figueroa-Bernier A, Tepp WH, Johnson EA, et al. Interneuronal transfer and distal action of tetanus toxin and botulinum neurotoxins A and D in central neurons. *Cell Rep*. 2016;16:1974–87.
 23. Cai BB, Francis J, Brin MF, Broide RS. Botulinum neurotoxin type A-cleaved SNAP25 is confined to primary motor neurons and localized on the plasma membrane following intramuscular toxin injection. *Neuroscience*. 2017;352:155–69.
 24. Mathew NT, Kailasam J, Meadors L. Predictors of response to botulinum toxin type A (BoNTA) in chronic daily headache. *Headache*. 2008;48:194–200.
 25. Jakubowski M, McAllister PJ, Bajwa ZH, Ward TN, Smith P, Burstein R. Exploding vs. imploding headache in migraine prophylaxis with botulinum toxin A. *Pain*. 2006;125:286–95.
 26. Sandrini G, Perrotta A, Tassorelli C, Torelli P, Brighina F, Sances G, et al. Botulinum toxin type-A in the prophylactic treatment of medication-overuse headache: A multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled, parallel group study. *J Headache Pain*. 2011;12:427–33.
 27. Pagola I, Esteve-Belloch P, Palma JA, Luquin MR, Riverol M, Martínez-Vila E, et al. Factores predictores de respuesta al tratamiento con onabotulinumtoxina A en la migraña refractaria. *Rev Neurol*. 2014;58:241–6.
 28. Gross EJ, Gladstone JP, Lewis S, Rogers R, Dodick DW. Duration of migraine is a predictor for response to botulinum toxin type A. *Headache*. 2004;45:308–14.
 29. Domínguez C, Jurado-Cobo C, Pozo P, Torres-Ferrús M, González Oria C, Monzón MJ, et al. OnabotulinumtoxinA in chronic migraine: Long-term outcome and predictors of efficacy in a large multicentre study in Spain. *Cephalgia*. 2016;36(1S):28–9.
 30. Cernuda-Morollón E, Martínez-Camblor P, Ramón C, Larrosa D, Serrano-Pertierra E, Pascual J. CGRP and VIP levels as predictors of efficacy of Onabotulinumtoxin type A in chronic migraine. *Headache*. 2014;54:987–95.
 31. Lee MJ, Lee C, Choi H, Chung C-S. Factors associated with favorable outcome in botulinum toxin A treatment for chronic migraine: A clinic-based prospective study. *J Neurol Sci*. 2016;363:51–4.
 32. Hubbard CS, Becerra L, Smith JH, DeLange JM, Smith RM, Black DF, et al. Brain changes in responders vs. non-responders in chronic migraine: Markers of disease reversal. *Front Hum Neurosci*. 2016 Oct 6;10:497.
 33. Guerrero AL, Diaz-Insa S, Lopez-Mesonero L, Oterino Durán A, Irimia P. Guías diagnósticas y terapéuticas de la Sociedad Española de Neurología. En: Ezpeleta D, Pozo-Rosich P, editores. Guía oficial de práctica clínica en cefaleas. Madrid: Editorial Luzan 5; 2015. p. 89–104.
 34. Aurora SK, Dodick DW, Turkel CC, DeGryse RE, Silberstein SD, Lipton RB, et al. OnabotulinumtoxinA for the treatment of chronic migraine: Results from the double-blind, randomized, placebo-controlled phase of the PREEMPT 1 trial. *Cephalalgia*. 2010;30:793–803.
 35. Diener HC, Dodick DW, Aurora SK, Turkel CC, DeGryse RE, Lipton RB, et al., PREEMPT 2 Chronic Migraine Study Group. OnabotulinumtoxinA for treatment of chronic migraine: Results from the double-blind, randomized, placebo-controlled phase of the PREEMPT 2 trial. *Cephalgia*. 2010;30:804–14.
 36. Cernuda-Morollón E, Pascual J. Algo se mueve en la migraña crónica. *Rev Neurol*. 2014;58:1–3.
 37. Domínguez-Vivero C, Jurado-Cobo C, Pozo-Rosich P, Torres-Ferrús M, González-Oria C, Monzón MJ, et al. OnabotulinumtoxinA in chronic migraine: long-term outcome and predictors of efficacy in a large multicentre study in Spain. *Cephalgia*. 2016;36(Suppl 1):28–9.
 38. Castrillo Sanz A, Morollón Sánchez-Mateos N, Simonet Hernández C, Fernández Rodríguez B, Cerdán Santacruz D, Mendoza Rodríguez A, et al. Experiencia con toxina botulínica en la migraña crónica. *Neurología*. 2016 Oct 21, pii: S0213-4853(16)30209-2.
 39. Silberstein S, Tfelt-Hansen P, Dodick DW, Limmroth V, Lipton RB, Pascual J, et al. Task Force of the International Headache Society Clinical Trials Subcommittee. Guidelines for controlled trials of prophylactic treatment of chronic migraine in adults. *Cephalgia*. 2008;28:484–95.
 40. Lipton RB, Rosen NL, Ailani J, DeGryse RE, Gillard PJ, Varon SF. OnabotulinumtoxinA improves quality of life and reduces impact of chronic migraine over one year of treatment: Pooled results from the PREEMPT randomized clinical trial program. *Cephalgia*. 2016;36:899–908.
 41. Silberstein SD, Dodick DW, Aurora SK, Diener HC, DeGryse RE, Lipton RB, et al. Per cent of patients with chronic migraine who responded per onabotulinumtoxinA treatment cycle: PREEMPT. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*. 2015;86:996–1001.
 42. Negro A, Curto M, Lionetto L, Marteletti P. A two year open-label prospective study of OnabotulinumtoxinA 195 U in medication overuse headache: A real-world experience. *J Headache Pain*. 2015;17:1.
 43. Láinez-Andrés JM. Onabotulintoxina A en el tratamiento de la migraña crónica. *Rev Neurol*. 2012;54(Supl 2):S39–50.
 44. Irimia P, Esteve P, Murie M, Martínez-Vila E. ¿Realmente es beneficioso usar las dosis de Onanobotulintoxina del estudio PREEMPT? *Rev Neurol*. 2014;58(Supl 2):S13–9.
 45. Relja M, Poole AC, Schoenen J, Pascual J, Lei X, Thompson C. A multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled, parallel group study of multiple treatments of botulinum toxin type A (BoNTA) for the prophylaxis of episodic migraine headaches. *Cephalgia*. 2007;27:492–503.
 46. Silberstein SD, Stark SR, Lucas SM, Christie SN, Degryse RE, Turkel CC, BoNTA-039 Study Group. Botulinum toxin type A for the prophylactic treatment of chronic daily headache: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. *Mayo Clin Proc*. 2005;80:1126–37.
 47. Oterino Durán A, Ramón C, Pascual J. Experience with onabotulinumtoxinA (BOTOX) in chronic refractory migraine: Focus on severe attacks. *J Headache Pain*. 2011;12:235–8.
 48. Cernuda-Morollón E, Ramón C, Larrosa D, Álvarez R, Riesco N, Pascual J. Long-term experience with onabotulinumtoxinA in the treatment of chronic migraine: What happens after one-year? *Cephalgia*. 2015;35:864–8.
 49. Aicua-Rapun I, Martínez-Velasco E, Rojo A, Hernando A, Ruiz M, Carreres A, et al. Real-life data in 115 chronic migraine patients treated with Onabotulinumtoxin A during more than one year. *J Headache Pain*. 2016;17:112.
 50. Guerzoni S, Pellesi L, Baraldi C, Pini LA. Increased efficacy of regularly repeated cycles with OnabotulinumtoxinA in MOH patients beyond the first year of treatment. *J Headache Pain*. 2015;17:48.
 51. Blumenfeld AM, Stark R, Adams AM, Orejudos A, Aurora SK. Efficacy and safety of onabotulinumtoxinA in an open-label study for the prophylactic treatment of chronic migraine in adult patients: COMPEL. *Cephalgia*. 2016;36(1S):27–8.
 52. Pascual J, Gaul C, Davier B, Brown S, Ahmed F. Real-life use of onabotulinumtoxinA for symptom relief in patients with

- chronic migraine: 12-month REPOSE interim analysis. *Cephalgia*. 2016;36(1S):39.
53. Negro A, Curto M, Lionetto L, Cialesi D, Martelletti P. OnabotulinumtoxinA 155 U in medication overuse headache: A two years prospective study. *Springerplus*. 2015 Dec 30;4:826.
54. Aurora SK, Dodick DW, Diener HC, DeGryse RE, Turkel CC, Lipton RB, et al. OnabotulinumtoxinA for chronic migraine: Efficacy, safety, and tolerability in patients who received all five treatment cycles in the PREEMPT clinical program. *Acta Neurol Scand*. 2014;129:61–70.
55. Blumenfeld AM, Aurora SK, Laranjo K, Papapetropoulos S. Unmet clinical needs in chronic migraine: Rationale for study and design of COMPEL, an open-label, multicenter study of the long-term efficacy, safety, and tolerability of onabotulinumtoxinA for headache prophylaxis in adults with chronic migraine. *BMC Neurol*. 2015;15:100.
56. Freitag FG, Diamond S, Diamond M, Urban G. Botulinum Toxin Type A in the treatment of chronic migraine without medication overuse. *Headache*. 2008;48:201–9.
57. Palma JA, Irimia P, Fernández-Torrón R, Ortega-Cubero S, Riverol M, Luquin MR, et al. Experiencia clínica del tratamiento con onabotulinumtoxin A en pacientes con migraña refractaria. *Rev Neurol*. 2012 Jun 16;54:705–11.
58. Grazzi L, Usai S. Onabotulinum toxin A (Botox) for chronic migraine treatment: An Italian experience. *Neurol Sci*. 2015;36(Suppl 1):33–5.
59. Khalil M, Zafar HW, Quarshie V, Ahmed F. Prospective analysis of the use of OnabotulinumtoxinA (BOTOX) in the treatment of chronic migraine: Real-life data in 254 patients from Hull, U. K. *J Headache Pain*. 2014;15:54.
60. Riesco N, García-Cabo C, Martínez-Ramos J, Pascual J. ¿Cómo convencer al jefe de Servicio y al gerente de la importancia de las unidades/consultas especializadas en cefaleas? *Rev Neurol*. 2015;61(Supl 1):13–20.
61. Bloudek LM, Stokes M, Buse DC, Wilcox TK, Lipton RB, Goadsby PJ, et al. Cost of healthcare for patients with migraine in five European countries: Results from the International Burden of Migraine Study (IBMS). *J Headache Pain*. 2012;13:361–78.
62. Lanteri-Minet M. Economic burden and costs of chronic migraine. *Curr Pain Headache Rep*. 2014;18:385.
63. Irimia Sieira P. El coste de las enfermedades neurológicas. *Neurologia*. 2008;23:1–3.
64. Carod-Artal FJ, Irimia P, Ezpeleta D. Chronic migraine: Definition, epidemiology, risk factors and treatment. *Rev Neurol*. 2012;54:629–37.
65. Batty AJ, Hansen RN, Bloudek LM, Varon SF, Hayward EJ, Pennington BW, et al. The cost-effectiveness of onabotulinumtoxinA for the prophylaxis of headache in adults with chronic migraine in the UK. *J Med Econ*. 2013;16:877–87.
66. Ruggeri M. The cost effectiveness of Botox in Italian patients with chronic migraine. *Neurol Sci*. 2014;35(Suppl 1):45–7.
67. Rothrock JF, Bloudek LM, Houle TT, Andress-Rothrock D, Varon SF. Real-world economic impact of onabotulinumtoxinA in patients with chronic migraine. *Headache*. 2014;54:1565–73.
68. Hepp Z, Rosen NL, Gillard PG, Varon SF, Mathew N, Dodick DW. Comparative effectiveness of onabotulinumtoxinA versus oral migraine prophylactic medications on headache-related resource utilization in the management of chronic migraine: Retrospective analysis of a US-based insurance claims database. *Cephalgia*. 2016;36:862–74.
69. Hernando-Asensio A, Porqueres-Bosch E, Aícu-Rapún I, Iglesias-Diez F. Reducción de costes sanitarios directos en pacientes con migraña crónica tratados con bótox. LXVII Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología. Barcelona, noviembre de 2015.
70. Diener HC, Dodick DW, Turkel CC, Demos G, Degryse RE, Earl NL, et al. Pooled analysis of the safety and tolerability of OnabotulinumtoxinA in the treatment of Chronic Migraine. *Eur J Neurol*. 2014;21:851–9.
71. Rojo E, Pedraza MI, Muñoz I, Mulero P, Ruiz M, de la Cruz C, et al. Diferencias entre migraña crónica con y sin uso excesivo de medicación; experiencia en una serie hospitalaria de 434 pacientes. *Neurología*. 2015 Apr;30:153–7.
72. Pascual J. Diferencias entre migraña crónica con y sin uso excesivo de medicación. *Neurología*. 2017;32:341–2.
73. Kollewe K, Escher CM, Wulff DU, Fathi D, Paracka L, Mohammadi B, et al. Long-term treatment of chronic migraine with OnabotulinumtoxinA: Efficacy, quality of life and tolerability in a real-life setting. *J Neural Transm (Vienna)*. 2016;123:533–40.
74. Russo M, Manzoni GC, Taga A, Genovese A, Veronesi L, Pasquarella C, et al. The use of onabotulinum toxin A (Botox®) in the treatment of chronic migraine at the Parma Headache Centre: A prospective observational study. *Neurol Sci*. 2016;37:1127–31.
75. Byun JI, Sim JY, Kim M. Prolonged effect of onabotulinumtoxinA on chronic migraine in 87 Koreans. *J Clin Neurol*. 2017;13:98–100.
76. Domínguez C, Jurado-Cobo C, Pozo P, Torres-Ferrúss M, González Oria C, Monzón MJ, et al. OnabotulinumtoxinA in chronic migraine: Long-term outcome and predictors of efficacy in a large multicentre study in Spain. *Cephalgia*. 2016;36(1S):28–9.