

NEUROLOGÍA

EMPLEO DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA EN EL ESTUDIO DEL SÍNDROME VESTIBULAR

Valentina Lorenzo Fernández, Alberto Muñoz Gonzalez, Isidro Mateo Pampliega.
Resonancia Magnética Veterinaria (Madrid).

Caso Clínico

Describir los resultados de estudios realizados por Resonancia Magnética (RM) en pacientes con síndrome vestibular (SV).

Materiales y Métodos

Se revisaron los estudios por RM realizados en 15 pacientes con síndrome vestibular de cualquier tipo, y se estudió la correlación entre las conclusiones y los datos clínicos.

Resultados

De los 15 pacientes estudiados, 8 tenían SV central. De estos, en 5 se diagnosticó neoplasia, y en 3 lesión inflamatoria. De los 6 casos con SV periférico, en 2 se diagnosticó otitis media-interna, 3 no demostraron alteraciones en RM, y en 1 caso se detectó un adenoma hipofisario, considerado un hallazgo casual. En el único caso estudiado con SV paradójico se detectó una lesión vascular en ángulo pontocerebeloso. En todos los casos, la categorización del tipo de SV se correspondió con los hallazgos en RM.

Conclusiones

La RM fue un método útil para determinar la causa del síndrome vestibular y la extensión de las lesiones, y consecuentemente, fue de ayuda para el establecimiento del pronóstico y tratamiento de los casos.

