

# Agenda del cunicultor

**TABLA DE DOSIFICACION Y POSOLOGIA DE LOS ANTIBIOTICOS PRINCIPALES PARA EL CONEJO (dosis mg/kg peso vivo)**

Familias	Antibióticos	Vía de administración	
		vía oral	vía intramuscular
Beta-lactaminas	Penicilina		50.000-100.000 UI/conejo
Aminoglucósidos	Estreptomicina		100-200 mg/conejo
	Neomicina	25 mg	
	Framicetina	5-10 mg	
Tetraciclina	Oxitetraciclina	40 mg	20 mg
Cloranfenicol	Cloranfenicol	30-100 mg	30-100 mg
Macrólidos	Eritromicina		100-200 mg
	Tilosina	200-500 mg/l	
	Spiramicina		50 mg
Polipéptidos	Colimicina	1,5-3 mg	1,5-3 mg

## TRABAJOS QUE HAY QUE PREVER PARA LOS PROXIMOS MESES

- El verano es la peor época para los conejos.
- Aumente la ventilación al máximo.
- Recuerde que los conejos no pueden soportar temperaturas por encima de los 30° centígrados.
- Los reproductores machos pierden poder espermatogénico con las altas temperaturas.
- Vigile bien sus disponibilidades de agua; procure que los bebederos estén limpios y que las conejas puedan saciar bien su sed; de lo contrario repercutirá en la producción láctea.
- Durante esta época puede adelantar el destete. Una práctica buena, cuando la temperatura ambiente es de 20° C, es efectuar el destete cuando los gazapos pesan 500 gramos.
- Si su instalación no está perfectamente montada para el calor, reduzca el ritmo de reproducción.
- En verano los gazapos crecen con acusada lentitud, debido a la pérdida de energía que supone la disnea.
- En verano amplíe la superficie por gazapo.
- Limpiar los planos inclinados de las baterías cada dos días; de lo contrario, se convierten en un vivero de larvas.
- Afronte el verano con sus conejos vacunados contra la mixomatosis, pues es la época más propicia para el padecimiento de esta enfermedad.