

Resumen del calendario de actos oficiales en Expoaviga'85(*)

Día	Hora	Lugar	Entidad organizadora	Acto
Martes, 19	9:00	Salas 1,2, y 3	Lonja Avícola-Ganadera de Bellpuig	Sesión de Mercado
	10:00	Sala 5	Asociación Española de Cunicultura —ASESCU—	Inauguración del X Symposium
	10:00	Sala 6	Sección Española de la WPSA —SEAMAC—	Inauguración del XXIII Symposium
	10:00	Sala de Actos del Palacio del Cincuenta-nario —SAPC—	Salón de la Técnica Avícola y Ganadera	La apicultura española ante el Mercado Común.
	10:15	Sala 6	Sección Española de la WPSA —SEAMAC—	I Sesión: La informática aplicada a la avicultura
	10:30	Sala 5	ASESCU	La cunicultura en la CEE
	12:00	Sala 5	ASESCU	Comunicaciones
	4:00	Sala 5	ASESCU	Mejora genética del conejo: situación actual y perspectivas.
	4:00	Sala 6	SEAMAC	II Sesión: Optimización del medio ambiente en avicultura.
				Sanidad: la varroasis.
Miércoles, 20	6:00	Sala 5	ASESCU	Comunicaciones.
	9:00	Sala 6	SEAMAC	III Sesión: Nutrición
	9:00	Sala 3	Asociación Española de Veterinarios Especialistas en Ganado Equino	Ponencias varias.
	10:00	Sala 5	ASESCU	Sesión divulgativa y práctica: Comunicaciones.
	10:00	Sala 7	Asociación Catalana de Caprinotecnia	Alimentación y manejo.
	12:00	Sala 6	SEAMAC	Comunicaciones sobre Nutrición
	1:00	Sala 5	ASESCU	Asamblea General Ordinaria.
	4:00	Sala 6	SEAMAC	IV Sesión: Bioquímica clínica avícola.
	4:00	Sala 5	ASESCU	Comunicaciones.
	4:00	Sala 7	Asociación Catalana de Caprinotecnia	Patología y terapéutica.
	4:00	SAPC	Asociación Española de Buiatría —AVEBU—	III Jornadas Buiátricas Internacionales: Ponencia sobre alimentación
	4:00	Sala 3	Asociación Española de Veterinarios Especialistas en Ganado Equino.	Ponencias varias
		Sala 3	Asociación Española de Veterinarios Especialistas en Ganado Equino.	Comunicaciones

Imaverol

solución

JANSSEN

COMO TRATAR Y PREVENIR LA TIÑA DEL CONEJO

La tiña del conejo

La **tiña**, dermatomicosis o dermatofitosis es una enfermedad muy contagiosa que afecta a los conejos, causada por hongos microscópicos y que produce alteraciones de la piel y caída del pelo.

El **contagio** puede ser **directo**, de animal, o **indirecto**, a través del aire por las esporas de los hongos existentes en el medio ambiente, que contaminan suelo, paredes, jaulas, material, etc. La **tiña** del conejo es **transmisible al hombre**.

En las zonas afectadas hay caída de pelo, formando áreas depiladas bien definidas y redondas. Al principio, la piel parece intacta, pero paulatinamente va haciéndose costrosa, dando a las lesiones un aspecto escamoso.

En los gazapos, los síntomas suelen ser más graves y visibles que en los conejos adultos, en los cuales pueden pasar desapercibidos y contagiar con facilidad a sus propias crías.

Es importante **no confundir** la **tiña** con la **sarna**, enfermedad producida por ácaros que requiere un tratamiento distinto (insecticida).

La **tiña** es una enfermedad **grave** del conejo, por ser muy **contagiosa** y de difícil eliminación, origina pérdidas económicas importantes (carne, pieles) y ser fácilmente transmisible al hombre.

Afortunadamente, en la actualidad es posible **controlar y eliminar** la **tiña** de un conejar mediante la aplicación adecuada de un nuevo medicamento antifúngico de amplio espectro:

IMAVEROL Solución

IMAVEROL es una solución concentrada que necesariamente hay que diluir en agua tibia antes de su empleo.

IMAVEROL se diluye en **50 partes de agua tibia**, logrando una emulsión dispuesta para su uso.

Ejemplos:

20 cc de IMAVEROL en 1 litro de agua.

100 cc de IMAVEROL en 5 litros de agua.



Con la emulsión diluida empapar (esponja, brocha) o rociar (pulverizador) **todo el cuerpo del conejo a tratar**. Repetir el tratamiento, cada 3-4 días, tres veces más.



IMAVEROL **no irrita** los ojos, la piel ni las mucosas. Los conejos pueden lamerse, ya que no es tóxico.




La emulsión diluida de IMAVEROL permanece activa durante más de 4 semanas.

A los animales tratados hay que protegerlos del frío cubriendo las jaulas con sacos o plásticos, hasta que estén completamente secos.

Cómo tratar

LA TIÑA

La **tiña** del conejo es una enfermedad



de «colectividad».

Es necesario tratar a **todos** los conejos que conviven con los enfermos en la misma jaula y la medicación ha de contactar con todo el cuerpo de los animales tratados. Tratar sólo a los enfermos y limitarse a las lesiones visibles, supone mantener indefinidamente la **tiña** en el conejar.

Con la emulsión diluida de IMAVEROL es posible **controlar por completo** la **tiña** de una explotación, aplicando con rigor las siguientes pautas de tratamiento:

1.- Reproductores

(machos y hembras) alojados **individualmente**

Tratamiento completo con la emulsión diluida de IMAVEROL cada 3-4 días, 4 veces).

2.- Reproductores en alojamiento colectivo

Tratamiento completo de todos los reproductores, con o sin síntomas clínicos, con la emulsión diluida de IMAVEROL (cada 3-4 días, 4 veces).

Imaverol

solución

Trade Mark
JANSSEN

3.- Conejas con camada

Tratamiento completo de la coneja y de todos los gazapos con la emulsión diluida de IMAVEROL (cada 3-4 días, 4 veces).

4.- Conejos destetados-recría-cebo

Alojar aparte a los conejos que presenten síntomas clínicos y someterlos a un tratamiento completo con la emulsión diluida de IMAVEROL (cada 3-4 días, 4 veces). A los demás, alojados en la misma jaula y sin presentar síntomas clínicos, tratar una vez, a fin de controlar la infestación de posibles portadores.

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Paralelamente a cada tratamiento, es indispensable efectuar una limpieza y desinfección a fondo del local, jaulas y material.

Cómo prevenir

LA TIÑA

La **tiña** del conejo es una enfermedad de fácil contagio e

insidiosa, que exige constante atención. No obstante, es posible



Prohibido

Impedir la entrada al conejar de perros, gatos, ratas, pájaros, etc., posibles portadores de la **tiña**.



Limpieza y Desinfección

Limpieza y desinfección periódica y frecuente de suelo, paredes y utillaje, mediante soplete donde sea posible y desinfectantes activos (yodóforos u otros).



Humedad

Evitar que la humedad interior del local supere el 70 % (H.R.) mediante calefacción, en caso



necesario, y mejora de la ventilación. La humedad ambiental excesiva favorece la **tiña**.

Sospechosos

Por último y muy importante: sólo dedicar a la reproducción machos y hembras absolutamente libres de **tiña**. A los reproductores dudosos o sospechosos hay que aislarlos y someterlos a un tratamiento completo con la emulsión diluida de IMAVEROL (cada 3-4 días, 4 veces). A los reproductores procedentes de otras explotaciones (teóricamente libres de **tiña**) es aconsejable tratarlos como a dudosos a su entrada en granja. Se elimina la posibilidad de que, aparentemente sanos, sean portadores y puedan contagiar al resto del conejar.



Antifúngico de amplio espectro en el tratamiento tópico de la Tiña del Conejo

Presentación:
En solución.
Envases de 100 ml y de 1 litro.

Licencia:
JANSSEN PHARMACEUTICA
Elaborado por:
Laboratorios Dr. Esteve, S.A.
Avda. Virgen de Montserrat, 221
Tel. (93) 347 93 11
08026 Barcelona

Día	Hora	Lugar	Entidad organizadora	Acto
Jueves, 21	4:40	SAPC	AVEBU	Mesa Redonda sobre alimentación
	5:30	Sala 6	SEAMAC	Asamblea General Ordinaria.
	9:00	Sala 6	SEAMAC	V Sesión: Patología y terapéutica avícola.
	10:00	Sala 7	Asociación Catalana de Caprinotecnia	Transformación.
	10:00	Sala 5	Asociación Nacional de Porcinocultura Científica —ANAPORC—	Profilaxis vacunal y medicamentosa de los procesos que afectan a la reproducción porcina.
	10:15	Sala 3	Institut Agrícola Català de Sant Isidre —IACSI—	Jornada sobre Ganado Ovino
	11:30	SAPC	AVEBU	Ponencia sobre ciclo ovárico.
	12:00	Sala 6	SEAMAC	Comunicaciones sobre patología
	12:15	SAPC	AVEBU	Mesa Redonda sobre fertilidad bovina.
	3:30	Sala 3	IACSI	Jornada sobre Ganado Ovino
	4:00	Sala 5	ANAPORC	Profilaxis vacunal y medicamentosa de los procesos respiratorios de los cerdos.
	4:00	Sala 6	SEAMAC	VI Sesión: Salmonelosis aviarias.
	4:00	SAPC	AVEBU	Ponencias sobre trastornos respiratorios.
	5:15	SAPC	AVEBU	Mesa Redonda sobre trastornos respiratorios.
Viernes, 22	5:30	Sala 6	SEAMAC	Comunicaciones sobre patología.
	6:00	Sala 3	IACSI	Mesa Redonda sobre diversos aspectos de la exposición del ganado ovino.
	8:30	Sala 6	Asociación Veterinaria Española de Especialistas en Pequeños Animales —AVEPA—	Inauguración de las XIX Jornadas Nacionales
	9:00	Sala 6	AVEPA	Ponencias sobre diagnóstico y terapéutica de enfermedades oculares.
	10:00	Sala 5	ANAPORC	Ponencias y comunicaciones.
	11:00	SAPC	AVEBU	Ponencias sobre corticoterapia y trastornos locomotores.
	12:50	SAPC	AVEBU	Mesa redonda sobre cojeras.
	1:00	Sala 5	ANAPORC	Asamblea General
	4:00	Sala 6	AVEPA	Ponencias varias
	5:00	Sala 6	AVEPA	Preparativos Mundial Buiatría.
Sábado, 23	9:00	Sala 6	AVEPA	
	10:30	Sala 3	Gremio de Detallistas de Animales de Compañía y Ornamentación y Asociación Nacional de Alimentos para Animales de Compañía	Ponencias sobre cuidados sanitarios y normativas de los establecimientos de animales de compañía.
	4:00	Sala 3	Gremio de Detallistas de Animales de Compañía y Ornamentación y Asociación Nacional de Alimentos para Animales de Compañía.	Ponencia sobre la técnica en las tiendas de animales de compañía
Domingo, 24	9:00	Sala 6	AVEPA	Ponencias sobre dermatología.

(*) Observaciones:

1. Todas las sesiones, salvo las indicadas, tendrán lugar en el Palacio de Congresos.
2. No se incluyen los actos oficiales ni los organizados por empresas privadas.
3. El Salón se hallará abierto cada día, de forma ininterrumpida, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde.