

Cuando digo, Es sabido que el
 conocimiento de uno de los miembros
 derivados extremos (por ejem el tipo
 τ o σ a la derecha) en la totalidad
 de los puntos de un intervalo
 determina la función excepto en
 una constante aditiva. En rela-
 ción con este resultado estoy
 investigando si la función viene
 asimismo determinada por el cono-
 cimiento en cada punto de un
 número derivado intermedio cual-
 quiera (si bien siempre a la derecha
 o bien siempre a la izquierda)
 Para este problema que de momento
 me parece difícil pero no inabordable
 me interesaría consultar una mi-
 nima de A N Singh publicada
 en el Bull Calcutta Math Soc
 Vol 10 pag 101 (1925-26) Le agradecería
 me indicara si este
 trabajo puede encontrarse en

alguna biblioteca de Madrid
pues en caso afirmativo me haria
sacar un microfilm.

Por el mismo correo escrito
al Rro. Rey Pastor para pedirle
si podria lograr un aumento
en el sueldo que percibo o bien
otro sueldo adicional. Si a
la vez fuera posible influir
en que se quedara
firmantemente agradecido, como
manera el Dr. Orts me
ha indicado que hoy por
hoy el Seminario Hall de
Barcelona le es imposible
mejorar mi sueldo.

Rogandole excuse la
molestia que pueda ocasionar
de este decreto el sueldo
que no dudo se tomara
reciba un fuerte abrazo de su
bien amigo y colega
J. G. G.