

Sucidi per foc, estudi descriptiu a l'Unitat de Cremats Vall d'Hebron

S G Fidel Kinori(*), M Herrero Rudo(**), JM Argüello Alonso (*)

(*) Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona;

(**) Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Sant Boi de Llobregat

Cometre suïcidi amb foc, o intentar-ho, no és freqüent. Però no obstant això resulta una causa d'ingrés en unitats de cremats a tot el món, amb una evolució específica com a subgrup, per la seva gravetat.

Majoritàriament aquestes persones ja han estat prèviament diagnosticades de trastorns psíquics, però també poden presentar altres característiques clíniques, com l'abús de substàncies i / o els trastorns afectius.

A la Unitat Especialitzada de Cremats (UEC), l'Hospital Vall d'Hebron s'ingressen els pacients amb cremades de Catalunya i entre ells també als pacients que s'han autoinfligit ferides amb foc.

L'objectiu d'aquest estudi és presentar les característiques sociodemogràfiques i clíniques, com també l'evolució, dels pacients ingressats a la UEC després d'un intent de suïcidi amb foc. Es presenten els resultats d'un estudi descriptiu retrospectiu d'aquets ingressos efectuats a l'Unitat, des de l'any 2010 i fins a l'actualitat.

Es van analitzar les dades de N = 34 pacients, 28 homes i 6 dones, amb una mitjana d'edat de 40, 44 anys (rang entre 21 i 76). Es valoren les dades socio-demogràfiques, de les ferides i de l'evolució.

Es comparen els resultats amb altres estudis previs, per valorar semblances i diferències respecte d'altres poblacions.

Paraules clau: cremades, intent de suïcidi