

Nuevos productos

TORCIURA Solución



Solución líquida sulfamídico y antibiótico potenciada para el tratamiento de las afecciones respiratorias del ganado. Composición:

Composición:

N.-(6 metoxi-3-piridacil) sulfanilamida-3-Sulfanilamido-6-metoxipiridazina	100 g.
Diamino 5-(3,4,5-tritoxibencil)-pirimidina	20 g.
Cloranfenicol	80 g.
3-(0-Metoxifenoxil)-1,2 propanodiol	10 g.
Dexametasona	1 g.
Vitamina A	2.000.000 U.I.
Acido L-ascórbico	40 g.
Saborizante	c.s.
Excipiente soluble c.s.p.	1.000 cc.

Para más información dirigirse a
Laboratorio A.G.C. (Avícola Ganadera Cataluña, S.L.)

ALFAMICETINA 100 "premix"

Antibiótico macrólido en premezcla de uso en piensos medicados para aves y cerdos a base de un nuevo compuesto denominado Kitasamicina.

Composición: 10 g. de actividad de Kitasamicina (actividad) por 100 g. de excipiente.

Para mayor información dirigirse a:
Laboratorios Dr. Esteve, S.A. — Avda. Virgen de Montserrat, 221



Cartas de los lectores (viene de página 280)

raciones diferentes que correspondan a los citados períodos?. En caso contrario, les agradecería me dieran a conocer sus recomendaciones.

J.T. (Pontevedra)

La pregunta que Vd. nos plantea es mucho más amplia de lo que se puede imaginar aunque intentaremos concretar.

En realidad el broiler tiene unas necesidades diferentes día tras día a lo largo de su crianza. Lógicamente, dentro de una semana determinada, las diferen-

cias en sus requerimientos serán mínimas pero a lo largo de un período mayor de tiempo aumentan considerablemente. Ello nos lleva a la conclusión de que lo ideal sería la preparación del mayor número posible de raciones, cosa que obviamente choca con los intereses del criador e incluso de la fábrica de piensos pues ello sería una complicación práctica considerable.

Nada cuesta —aunque es imposible hacerlo en estas líneas— realizar un estudio de las necesidades del broiler a lo largo de cada día de su crianza y luego intentar plasmarlas en una serie de

fórmulas —habitualmente dos o tres y más raramente un mayor número— para ser suministradas en los diferentes períodos en que dividamos esta crianza. Bajo tal supuesto, el planteamiento de Jensen —como de otros autores— de dividir la crianza del broiler en tres períodos es totalmente correcto por más que debamos recordarle que el suministro de una ración de "finalización" de una semana y media de duración obedece principalmente, en los Estados Unidos, a la obligación legal de retirada del coccidiostato, amén de otros considerandos económicos.