

SEMANARIO  
DE AGRICULTURA Y ARTES  
DIRIGIDO Á LOS PÁRROCO

*Del Jueves 31 de Agosto de 1797.*

AGRICULTURA.

*Sobre la fecundacion de las plantas.*

**T**odos los vivientes tienen la singular propiedad de reproducirse , para lo qual está dotado cada individuo de las facultades necesarias , ya para procrear sin depender de la concurrencia de otro , ya valiéndose de esta concurrencia quando él se halla destituido de los medios de reproducirse por sí solo. Muchas veces se observa con admiracion la mezcla de diferentes especies de que nacen plantas nuevas, bastardas y monstruosas.

La generacion de los animales , y la fecundacion de los vegetales , han excitado en todos tiempos la curiosidad de los sabios que no contentos con admirar las maravillas de la naturaleza , no han desmayado en el empeño de escudriñar sus mas ocultos secretos. Pero hasta ahora ha reusado ésta una respuesta decisiva á sus indagaciones : bien es que ya se ha llegado á descubrir por qué medios desempeña esta importante operacion. Se ha adelantado la anatomía en los dos reynos animal y vegetal , pero lo que prueba que no hemos llegado todavia á conocer en qué consiste el verdadero origen de la procreacion , es el gran número de sistemas que se han imaginado para explicar este misterio : exâminemos , pues , solamente lo que pertenece á la generacion de las plantas.

Ya hace mucho tiempo que se habia descubierto , que

TOMO II.

i

las

las plantas gozaban de una facultad de reproducirse muy semejante á la de los animales: el mismo Plinio y Theofrasto habian observado, que sin la concurrencia de la palma macho no se podia fecundar la palma hembra. En el siglo XVI. observó un botánico polaco la misma distincion de sexos en otros vegetales, y que en muchos se hallaban reunidos, y en otros separados.

A fines del siglo pasado se hizo la delicada observacion de que cortando en las flores de algunas plantas los *estambres*, esto es, las partes que desempeñan las funciones del macho, antes de que hubiesen fecundado á la hembra, no maduraban los frutos de ellas. Este descubrimiento no tuvo entónces la aceptacion que merecia hasta que en nuestro siglo lo han comprobado varios célebres naturalistas, reconociendo evidentemente el verdadero oficio de los estambres y del *pistilo*, que es la parte hembra; lo que dió motivo al famoso sistema del célebre Lineo sobre la disposicion de las partes machos y hembras, absolutamente necesarias para la fecundacion de las plantas, como para la de los animales.

La descripcion exácta de estas partes es indispensable para la inteligencia de este artículo, y la particular semejanza que se advierte entre la generacion de los vegetales y la de los animales, nos admirará tanto mas, quanto mejor conozcamos su mecanismo. La imaginacion de los que han escrito sobre este punto, acalorada en la observacion de los admirables fenómenos de la naturaleza, creia ver en el acto de la fecundacion de las plantas los himeneos, bodas, talamos y demas costumbres nuestras. Dexemos estas comparaciones y demos algunas ideas útiles. La flor de los vegetales se compone de caliz, corola, estambres y pistilo. No siempre es completa, pues muchas se hallan sin caliz ni corola, pero nunca dexa de tener estambres y pistilo, que son las partes que desempeñan la generacion.

El caliz es aquella parte, por lo comun verde, que está en lo inferior de la flor, como se vé en la rosa, en el clavel &c. cuya forma y divisiones son de muchas maneras. La corola es aquella ó aquellas partes, que el vulgo llama flor, cuyos colores y formas varian, y se halla den-

tro del caliz, como se vé en la rosa, frésa, zarza &c.: los estambres son el sexó masculino; constan de dos partes, el hilito y la bolsita que tienen á la punta que se llama *antera*: esta es indispensable para la propagacion, porque en ella está el polvillo que ha de fecundar á la parte hembra. Los estambres siempre estan dentro de la corola (cuando esta existe) como se vé en la rosa, tulipanes &c. El polvo fecundante se compone de granitos sumamente finos, y cada uno de ellos contiene una especie de licor muy sutil que parece aceytoso, y que es el verdadero agente de la fecundacion. Si este polvillo se echa sobre un papel se observará que le mancha, como si fuera aceyte, y está probado que la cera no es otra cosa que el polvo de los estambres que la abeja recoge de las flores. La estructura del pistilo, que es la parte hembra, no es menos admirable: está situado en el centro de la flor; se compone del embrion (que despues pasa á fruto) de hilo y de *estigma* al remate, que suele ser como una bolita esponjosa en que está la abertura triangular, redonda ó lineal por donde se introduce el polvo fecundante. Quando éste está en su sazon en las anteras, el ayre, los insectos ó los mismos estambres lo acercan al estigma, en cuyas fibras vegetales causa cierta irritacion, y baxa por el centro del hilo, ó como llaman los botánicos *estilete*, al embrion, el qual fecundado crece hasta perfeccionarse la obra que es el fruto para propagarse la especie. Así que, perjudicará al fruto y disminuirá las cosechas todo lo que impida que el polvo fecundante llegue al pistilo, y como las nieblas densas y continuadas lluvias, quando las plantas están en flor, arrastran y pierden este polvo fecundante, véase la razon porque en aquella ocasion perjudican tanto á las cosechas.


Quando los dos sexós no estan sobre un mismo pie, ya sea árbol, ya sea yerba, si el macho no está en las cercanias de la hembra, se aventura el fruto, y muchas veces se malogra: la suma variedad que hay en la formacion de las flores, hace que en algunas plantas se oculten estas partes á la vista del que no está acostumbrado á observarlas. En la lámina 3.<sup>a</sup> se representa la flor del almendro para que por ella se haga juicio de las demás: a. la flor ente-


ra: *b.* el caliz: *c.* el mismo separado de las demás partes: *d.* el mismo abierto, en cuyo centro está el germen: *e.* terminado por el estilete *f.* que remata en el estigma *g.*: *h.* *h.* los estambres que salen de la parte interior del caliz y sus anteras: *iiii.* la corola compuesta de cinco hojas ó *petalos*.

Estos conocimientos no servirán de puro entretenimiento al labrador instruido: la falta de ellos es causa de que no aproveche algunas cosechas con la ventaja que debe. Se vé freqüentemente, que donde se cultiva el maíz, cortan las puntas de la planta, que creen inútiles, porque no dan fruto, para darlas á las caballerías si les falta yerba, y tales puntas son justamente los machos, sin cuyo polvo fecundante no darian fruto las cañas hembras. Quando se siembran juntas calabazas, cohombros, melones y otras plantas de una misma familia, degeneran regularmente porque el polvo fecundante pasa de unas flores á otras, y salen frutos bastardos. Los algarrobos, pistachos y otros árboles de un solo sexo deben tener en su proximidad al árbol del sexo que les falta, y por no conocer esta necesidad muchos labradores del reyno de Valencia, han cometido el error de cortar los machos como inútiles porque no dan fruto, sin reflexionar, que sin ellos tampoco lo darán las hembras. Mas cautos los de Elche multiplican las palmas machos en las inmediaciones de las hembras para asegurar el fruto que les produce sumas quantiosas.

Don Antonio de Martí, de la real academia de ciencias y artes de Barcelona, publicó en el año de 1791<sup>1</sup> varios experimentos y observaciones sobre los sexos y fecundidad de las plantas, y habla con tanta sabiduría y juicio sobre este importante ramo de la botánica, que quisieramos poderle copiar á la letra. Hizo delicadas observaciones sobre el cáñamo, cuya planta tiene los sexos separados, y se confirmó en que era necesaria la comunicacion de uno y otro para la fecundacion de esta planta. Examinó otras varias con igual acierto y delicadeza, confirmándose mas y mas en lo mismo que había observado sobre el cáñamo. Su memoria merecerá siempre el mayor aprecio de los sabios,

<sup>1</sup> En Barcelona: por la viuda de Piferrer: vénese en su librería.





no menos que la modestia con que un hombre tan benefíci-  
merto la presentó á la real academia médica-práctica de  
dicha ciudad.

*Continúa el artículo sobre la instrucción de la  
cria y ceba de los cerdos.*

*Del tiempo y modo de cebar los cerdos.*

Quando llegan á la edad de diez meses poco mas ó menos, se pueden poner á cebo los cerdos que se destinan para salar; pero la matanza no debe hacerse hasta que hayan cumplido año y medio, y aunque se diga dos años, porque es quando ya el tocino está perfectamente hecho y en la sazon debida. Se sabe que no dexan de crecer y engordar hasta los quatro y aun cinco años; pero no por eso conviene dejar tanto tiempo (sin pagar los cuidados que ha costado su crianza) á unos animales que solo son útiles despues de muertos. Lo primero que debe procurarse, es conocer los que son de buena calidad para engordar, conforme á los indicios que enseña la experiencia, pues no todos son capaces de adquirir unas medras correspondientes á los gastos que se hacen con ellos.

Hay varios medios para ayudar á que engorden quasi á voluntad nuestra los animales domésticos, especialmente los cerdos. Estos medios se pueden reducir á quatro: primero, la castracion: segundo, la especie y calidad del alimento: tercero, la estacion: quarto, el reposo en que debe estar el animal.

I. La castracion del cerdo puede hacerse á qualquiera edad, bien que quanto mas antes se haga, tanto menos funestas son las conseqüencias: en algunas provincias la ejecutan á las seis semanas, ó dos meses: en otras aguardan á los quatro meses, y aun á los seis; pero si se hacen en el tiempo que están matando, se curan mucho mas pronto, y dan un tocino mas delicado, bien que de grandes no adquieren tan buena figura. Nada importa la estacion, con tal que haga un tiempo templado; porque los calores vivos, ó

los grandes frios, hacen la herida peligrosa ó muy dificil de curar. La operacion se ejecuta de dos modos: ó arrancando completamente los testículos, ó haciéndoles una ligadura; pero este ultimo es bastante dificil, por lo muy grueso que es el cordon espermático de este animal.

Algunos escritores son de sentir, que valdria mas criar los cerdos sin castrar, supuesto que los verracos no son mas costosos en su alimento que los castrados, crecen mas, y por consiguiente dan mas tocino; y que las hembras pueden dar algunos hijos antes de matarlas. Su tocino, dicen, no es tampoco menos estimable, con tal que no se dilate muchos años su matanza, porque hay medios de hacer que no saque la aspereza y mal gusto que regularmente se observa. Estos medios son: castrar el verraco, quando ya no ha de servir mas: dexarle despues que se ponga bien flaco, é inmediatamente ponerle á todo cebo: y de este modo se han visto verracos viejos ponerse muy gordos y dar un tocino bastante sabroso y delicado. En quanto á las guerras, se emplea el medio cruel de matarlas antes de parir, porque en este estado es quando su tocino tiene las buenas qualidades que se desean. Pero yo no tengo bastantes datos para conformarme con estas aserciones.

Los cerdos que deben preferirse para criar son los que nacen en el mes de Marzo, porque quando llega el invierno tienen ya bastante robustez para resistir al frio, que si no suele traspasarlos é impedir su crecimiento. Algunos creen que los mejores son los que toman los primeros pezones; otros que las hembras son preferibles á los machos, porque dan mas tocino, y por consiguiente mas utilidad; pero hay muy pocas observaciones que lo confirmen.

Aunque la fecundidad de las guerras es mas durable que la de los verracos, es necesario interrumpirla quando tocan al sexto año de su edad, porque pasado de aquí, ya no se las puede hacer engordar: y por la misma causa, no se dexa pasar al verraco de cinco años. A uno y á otro se les hace entonces la operacion, y luego que se verifique, se hará que den un paseo por espacio de dos horas, cuidando de no perderlos de vista, porque la fiebre momentanea que les acomete, les instiga á buscar el agua, y si se bañan, pierden

den indefectiblemente la vida. Esta operacion importante, que ningun autor indica, la recomienda mucho el ciudadano *Gertiere*, en una memoria que presentó á la sociedad de agricultura de París,

II. Para que el cebo haga buen efecto en los cerdos, es necesario prepararlos con alguna comida diluyente, que despues se va aumentando poco á poco en cantidad y consistencia, bien sea con harina de cebada, de centeno, ó de maiz, ó bien con guisantes. Otros aconsejan las habas y judias; pero segun las pruebas hechas últimamente en Inglaterra, se ha visto que estas legumbres son perjudiciales á los cerdos, sin embargo de ser muy provechosas á los bueyes y vacas. Con lo que se confirma la observacion que ya han hecho algunos prácticos, de que los alimentos que engordan y hacen buena carne á una especie de animales, á los de otra especie no les aprovechan, ó les dañan.

Aunque los cerdos beben poco, no se les ha de dexar padecer sed en ningun tiempo; pero tampoco ha de ser abundante la bebida, porque les quita de engordar, y el tocino no sale tan firme. Quando se acerca el tiempo de la matanza, hay muchos que no les dan á beber mas agua que la necesaria para remojar la comida.

Con las tortas de la linaza, que quedan en la prensa despues de sacado el aceyte de esta semilla, tambien engordan bastante los cerdos y otros animales, pero hacen un tocino blando, de mal gusto, que no puede conservarse, ni sirve para el picado de chorizos, longanizas, &c. Bien que el ciudadano *Bellegarde*, despues de repetidos experimentos, ha encontrado el medio de corregir estos defectos. Se reduce únicamente á mantener estos animales, en los últimos quince dias antes de la matanza con castañas, patatas cocidas, y mezcladas con salvado; de modo que podemos asegurar que aun la bebida abundante no daña, con tal que esté acompañada de alimentos nutritivos, y entre éstos son preferibles los farinaceos. Todo pende de las proporciones, y bajo este supuesto damos la preferencia á los alimentos de que vamos á tratar.

Uno de los cebos menos costosos, pero que solo puede usarse en las cercanías de los bosques, es el de las frutas sil-

vestres , particularmente la bellota y el fabuco , que los cerdos apetecen con tal ánsia , que suelen tragarl a sin masticar. Quien les vea quando van á recogerse por la noche , en tiempo de montanera , notará que apenas se pueden sostener , y parece que van á caerse á cada paso : fenómeno que muchos han mirado como una verdadera embriaguez ; y de aquí han tomado motivo algunos autores , que tienen la mania de querer hallar la razon de todo , para atribuirlo á la propiedad fermentativa de los frutos , y su transformacion en licor viñoso , creyendo que esto se puede verificar aun en el estómago de los animales. Pero en la realidad no es mas que un efecto de la demasiada carga de alimento , que obra al mismo tiempo sobre el cerebro , y ocasiona una especie de apoplegia momentánea ; de modo que en este caso están los cerdos repletos como glotones , pero no embriagados como bebedores de licores fermentados.

La costumbre de echar los cerdos á la montanera es muy antigua , como que ya hablan de ella las primeras obras de economía rural , y de aquí nacen las ordenanzas establecidas por los primeros Reyes , para el arreglo de lo que se debia observar en este punto , y las precauciones que habian de guardarse para evitar que los robasen , especialmente por la noche , que la pasaban en el mismo monte. La costumbre que hay en Francia para el ajuste de la bellotera es de dos maneras : ó bien el juez del partido toma por su cuenta una dehesa proporcionada al ganado que hay en su jurisdicion , y despues reparte el coste á cada propietario , según el número de cabezas que tiene : ó bien los propietarios de grandes piaras toman por sí solos la bellotera que necesitan para sus cerdos ; pero de qualquier modo saben estos animales con su voracidad resarcir á su dueño el gasto que le causan , de suerte que á la vuelta del monte no necesitan mas que un poco de agua blanca , y aun les basta agua pura. Son muy pocas las veces que la bellota prospera dos años de seguida , y por esto es muy conveniente dedicarse á conservarla , haciéndola secar en un horno , despues de sacado el pan , ó valiéndose del tostador que emplean en las provincias meridionales de Francia para conservar las castañas , con lo qual se logra que no se pudran ni se entallezcan. Des-

pues

pues se amontonan en un sitio seco , y quando han resudado bastante , se las mantiene sin moverlas hasta el caso de necesitarlas. Será bueno igualmente molerlas ó ponerlas en agua por algunas horas , antes de darselas á los cerdos , porque así deben ser mas nutritivas , y no puede resultar de esto el menor inconveniente.

Otro de los cebos mas fáciles de obtener son las patatas , que ya hemos indicado como un recurso esencial para el caso. La bellota falta con freqüencia : muchas veces suben de precio los granos , las aechaduras y los despojos de los mataderos : ¿ qué alimento puede hallarse en tales casos , que sea mas sustancioso , mas conforme á la constitucion física de los cerdos , ni menos costoso ? Al principio de la ceba pueden darse crudas , cortadas en rebanadas , y rociadas con agua sazonada con sal , porque así toman sabor y hacen un alimento menos refrescante , mayormente si se mezlan con otras raíces , como navos , remolachas silvestres , &c. pero el último mes de la ceba será necesario cocerlas , porque de este modo se combina la parte aquosa con los demás principios , y resulta un alimento mas sólido ; y aun lo será mucho mas si se añade alguna porcion de harina de qualquiera especie de granos. Esto es tanto mas conveniente , quanto en aquel tiempo se procura dar á los animales comidas que reunan mucha sustancia en poco volumen. Tambien se podria adelantar la cosecha de estas raíces , para que pudiesen seguir inmediatamente á las yerbas , que por lo regular fenenecen á fines del verano : y de este modo habria todo el año comida para estos animales , haciendo que se sucediesen alternativamente las plantas y raíces de cada estacion. ¡Qué beneficios no podrá prometerse qualquier labrador que para el cultivo de las raíces comestibles pueda destinar anualmente dos terrenos proporcionados , uno al consumo de su familia , y otro al mantenimiento de su ganado.

Se han hecho varias pruebas para ver si se podria engordar á los cerdos con los despojos de los mataderos y carnicerías , pero no han surtido buen efecto : quando mas han servido para justificar la observacion de que estos animales no digieren bien la carne cruda , y si la comen con alguna abundan-

dancia, los recalienta á punto de ponerlos furiosos. No hay otro medio de salvar estos inconvenientes que el de cocer los tales despojos, y esta observacion, que hace ver la alteracion notable que el fuego causa á las materias aliménticias expuestas á su accion, debe mirarse como muy importante para la economía animal. Lo mismo siente el ciudadano *Gueret* en una memoria dirigida á la sociedad de agricultura de París, sobre el establecimiento formado á una legua de Metz, donde propone que la sangre de los mataderos sirva para mantener los cerdos. Este humor, que conforme á la sublime idea de *Bordeu*, puede mirarse como una *carne líquida*, necesita ser cocido, como las demas substancias animales, para que pueda servir de alimento provechoso. ¡Qué felicidad, si la sangre de nuestros mataderos fuese siempre destinada á objeto tan útil! si los demas despojos de estas oficinas se aprovechasen, en vez de abandonarlos á que infecten el ayre y ofrezcan á la vista el espectáculo mas asqueroso!

Pero qualquiera que sea el alimento destinado á la ceba de los cerdos, siempre es necesario mezclarle con otro para lograr buenos efectos. Es cosa bien sabida que el tocino de los cerdos engordados con bellota sola, es muy fácil de enranciarse: que quando se ha empleado el fabuco solo, se derrite á muy poco calor, recibe la sal con dificultad, y se pone amarillo á poco tiempo: y que en fin de las patatas resulta un tocino blando y de tan poca consistencia que en la olla se deshace quasi del todo; lo que parece demostrar la necesidad de mezclar unos alimentos con otros, para que de su conjunto salga un resultado perfecto. Pero *Mortimer* en su *agricultura completa* asegura haber hecho matar algunos cerdos mantenidos con bellotas, y haber hallado un tocino tan firme y de tan buena calidad como si los hubiera mantenido con guisantes. Sin embargo, como se asegura generalmente que existen los inconvenientes referidos, el mejor medio de salvarlos es concluir la ceba empleando alguna especie de grano farinaceo, cocido ó molido, formando con su harina puches claras al principio, que se van haciendo mas espesas conforme se acerca el término de la matanza. Esta es la comida que mas les gusta á los cerdos, que hace una mantea blanca y agradable, especialmente si algunas semanas

antes de matarlos se les añaden algunas yerbas aromáticas, como pimpinela, perifollo, y otras, sin olvidar nunca la sal, porque no hay cosa mas esencial que este condimento en quanto se da de comer á los animales, con especial á éstos; y entonces se les debe escasear la bebida. Quando dexan la comida de sobra, ó van perdiendo sensiblemente el apetito, ya no tardan en reunir todas las condiciones de una perfecta ceba, ó por mejor decir, ha llegado á su último término. *Se concluirá.*

### L I B R O.

*Annales de l' agriculture françoise, &c. Anales de la agricultura francesa, obra periódica que publican en París los ciudadanos Tessier y Rougier, miembros del instituto nacional de Francia, auxiliados por los ciudadanos Dubois, Huzard, Gilbert y Villemorin.*

En el prospecto se proponen tratar 1º del cultivo de las tierras, de las huertas, prados artificiales, sus productos y empleo de ellos. 2. Del modo de desecar y cultivar los terrenos; de evitar los funestos efectos de las inundaciones; de los riegos, y cómo se han de utilizar y mantener. 3. Del cultivo de los árboles frutales, de las vides, moreras, olivas; arte de hacer el vino, cidra, cerveza, aceyte; del cuidado de las colmenas y de los gusanos de seda. 4. De las invenciones y mejoras que se consigan en los instrumentos de la labor. 5. Del modo de mantener los bosques, de corregir los destrozos que se han hecho en ellos, y de connaturalizar algunos árboles extrangeros. 6. De la veterinaria, cría y mejoras de animales domésticos, y sobre todo del ganado lanar. 7. De la policía rural, y de los delitos, y abusos que en ella se cometan para su corrección. 8. De la población comparando entre sí las diferentes provincias de la república y el régimen dietético conveniente á cada país. 9. De las observaciones meteorológicas; su influxo sobre las cosechas, y medios de prever sus efectos. 10. De las leyes y determinaciones del gobierno relativas á los impuestos, á la agricultura, y al comercio. 11. De los descubrimientos y obras nuevas, así naturales como extrangeras, que traten de economía rural ó política. 12. Del precio de los granos, se-

millas de comer, y harinas en París y en los puertos. Finalmente, los redactores ofrecen diseños de las cosas que los exijan para poderse comprender.

Cada diez días, comenzando desde el 20 de Mayo del presente año, publican un quaderno en octavo marquilla de 48 páginas en buen papel y letra: se suscribe en París en casa de los libreros Huzard, calle del Eperon, núm. 11. y Debray, Palais Egalité, galerie de bois, núm. 235. El precio de la suscripción es 27 libras tornesas en París, y 30 en los departamentos de la república, y no se admite por menos de seis meses.

*Nota.* Tendremos presente este importante periódico para aprovecharnos de sus luces con tanta mas razon, quanto los sabios redactores, al tiempo de publicar en su núm. 4. un extracto de los 10 primeros números del Semanario, que habian llegado á sus manos, tienen la generosidad de indicarnos las obras en que se tratan con mas extensión las materias de que hemos hablado. Por qué, añaden, no han de trabajar todas las naciones de comun acuerdo en perfeccionar su agricultura? ¿Qué inconveniente hay en que los hombres de todos los países se comuniquen mutuamente sus conocimientos? Sabemos que la política mercantil convida á los pueblos activos á aprovecharse del descuido de los otros para hacerlos sus tributarios: máxima funesta sobre la qual se ha dirigido siempre la avaricia de los mercaderes de Inglaterra que tanto influxo tienen en las provincias de su gobierno, como sino fuesemos primero hombres, que miembros de tal y tal sociedad, y como sino fuese un crimen el que entre hermanos se oculten aquellos conocimientos útiles á su conservacion y bien estar. Ameñemos enhorabuena nuestra patria, empleemos toda nuestra energía en conservar su territorio; y sea la primera á quien tributemos las primicias de nuestras invenciones y talentos; pero extiéndanse nuestros conocimientos mas allá de las fronteras, y recibamos en cambio igual recompensa. ¡Ojalá que quando las naciones tienen la desgracia de hacerse la guerra, se supiese respetar siempre esta especie de comercio, mas importante que el de las mercaderías: las ciencias y las artes, jamás deben tener enemigos."

*Observaciones sobre las plantas y yerbas de que se componen los prados naturales y artificiales de Inglaterra, con sus nombres botánicos segun Linneo, sus nombres Castellanos, Ingleses y Franceses: por D. Claudio, y D. Esteban Boutelou.*

Por un modo semejante al que tienen los ingleses para el cultivo de sus tierras, podriamos facilitar á nuestros labradores los medios mejores de prevenirse en todas las estaciones del año con suficiente alimento para mantener toda suerte de ganados. Se conseguiria de este modo en muchas partes de España la misma ventaja, que se logra al presente en Inglaterra: á saber, qué por el repartimiento ó division qué hacen de sus haciendas, destinando sola una parte de ellas á la cultura de los trigos y otros granos, aprovechan lo restante del terreno en el cultivo de las plantas y yerbas, que han de servir despues á sustentar sus diversos ganados y caballerias. Es de observar que no dan en aquel reyno á éstas otra comida que heno, avena ó habas, pretendiendo que la cebada, no prueba bien á las caballerias, y empleando toda la que se coge en la composicion de sus cerbezadas. Sin hacer cuenta de la leche, manteca y quesos, que con tanta abundancia logran los Ingleses con motivo de sus praderas, hay ademas otras muchas ventajas y aprovechamientos, que consigue el labrador dedicando parte de sus tierras á la cria de los ganados: se aumentan los abonos, las lanas y pieles, y creciendo el número de las reses, que nos sirven de alimento, á su abundancia se sigue necesariamente el bajo precio de los abastos.

Se conocen dos modos de procurarse semillas para la formacion de los prados, el primero es el de trillar el heno compuesto de plantas diversas luego que esté bien maduro; pero en este caso, si no es el heno de una calidad muy especial, suelen ir mezcladas las simientes de las buenas yerbas con otras de plantas nocivas: el otro modo, que es el que debe seguirse, consiste en cultivar separadamente de por sí cada especie particular, y mezclarlas en la siembra en la proporcion mas conveniente. Hay algunas plantas, que no obstante ser sabida su buena calidad y abundante produccion, no se pueden cultivar con la prolixidad que fuera menester, sien-

do dificultoso recoger sus simientes en grandes cantidades. Hay otras que por el poco conocimiento y menos observacion de los labradores, quedan ignoradas aunque se presente á la vista su utilidad, por no querer aventurarse á hacer experimentos sobre ellas los que tienen mas á mano los medios de executarlo. Para no errar en este punto, conviene escoger, entre las yerbas naturales del pais, las que producen mayores macollas, y son mas apetecidas de los ganados, desechariendo generalmente como malas á las que arrojan muchos tallos y pocas hojas, por producir un henó áspero y de poca sustancia. Además de la calidad y finura hay tambien que considerar su cantidad ó abundancia, procurando reunir estas dos propiedades en las yerbas que se elijan.

Se dividirán estas observaciones en quatro secciones: la primera comprenderá las plantas que se crian naturalmente en los prados, y se cultivan además separadamente para formar praderas por sí solas: en la segunda entraran las plantas que nacen en los prados y podrian cultivarse con utilidad separadamente: en la tercera se contendrán las plantas que componen los prados ordinarios; y en la quarta y ultima division se dará una razon de todas las plantas que se emplean ó pueden emplearse provechosamente para el sustento de los ganados.

### Sección primera.

*Plantas que se encuentran naturalmente en los prados, y se cultivan separadamente para formar praderas artificiales.*

*El Vallico de los Castellanos*<sup>1</sup>, es una de las plantas mas estimadas de los ingleses, para la formacion de sus praderas artificiales: es yerba temprana, que procura al ganado un pasto abundante y de mucho alimento. Venden todos los años los Ingleses una cantidad muy considerable de sus simientes á Dinamarca, Suecia, Rusia, y otros países del norte.

En las praderas de S. M. de este Real sitio de Aranjuez,

llá-

<sup>1</sup> *Lolium perenne*, de Linneo: *Ray-grass*, ó *Yvraie* vivace de los Franceses: *Ray-grass*, *Rye-grass*, *Rey-grass*, ó *Darnel* de los Ingleses.

llamadas de los árboles de San Raymundo, á el cargo de nuestro padre Don Pablo Boutelou, se levanta á mas de tres pies de altura, y forma una yerba espesísima por lo mucho que ahija. Tiene el inconveniente de no poderse segar mas de una vez al año, de suerte que conviene sembrarla mezclada con otras plantas, entre las cuales las mas especiales son los varios treboles; el de flor encarnada \* como mas productivo es el mejor. De esta manera, despues de segado el vallico, queda el trebol para el pasto de los ganados; floreciendo temprano es fácil de recoger con abundancia semillas suyas: se cria naturalmente en España, y prevalece con mas lozanía en tierras húmedas, frescas, ó de regadío.

*La Poa anual de los Castellanos*<sup>1</sup>, es una yerba que se cria con bastante abundancia en toda clase de terrenos, y solo se levanta á dos ó tres pulgadas en tierras áridas y de mala calidad, forma con suficiente abono y humedad, una de las gramíneas mas tiernas y mas apetecidas de los ganados. Se cultiva mucho separadamente en el Condado de Suffolk, en donde es preferida á casi todas las demás yerbas para la formacion de praderas perenes ó de dura; pues aunque es planta anual, es con todo tanta la abundancia de semillas que produce, que por sí misma sigue multiplicándose despues, una vez nacida en un terreno. Esta yerba es poco productiva, y suele estar en flor casi todo el año; pero es dificultoso de recoger sus simientes, cayéndose al suelo al instante que estan maduras.

Se ha observado que producen mas leche las vacas, que han pastado en praderas de esta planta, que sustentándose con otras yerbas.

*El Holco lanudo de los Castellanos*<sup>2</sup>, sirve para formar prados en algunos Condados de Inglaterra, y mas particularmente en el de Oxford, y en el de York, de donde le ha venido á esta planta entre los mercaderes de semillas de Lóndres su nombre de *Yorkshire-grass*. Aunque la come bien el ganado, hay otras plantas mucho mas de su gusto,

\* *Trifolium pratense* de Linneo: Trèfle des prés de los Franceses.

<sup>1</sup> *Poa annua*, de Linneo: Paturin annuel de los Franceses: Meadow-grass, ó *Suffolk-grass* de los Ingleses.

<sup>2</sup> *Holcus lanatus*, de Linneo: Houque laineuse de los Franceses: *Yorkshire-grass*, soft-grass, white hay-seed of *Yorkshire* de los Ingleses.

to, que podrian cultivarse con mayor utilidad. El vello que tan abundantemente cubre todas sus hojas y tallos, sera tal vez uno de los motivos principales de la poca aficion que suele mostrar el ganado á este pasto, especialmente si tiene otros en qué escoger.

En las praderas de los árboles de San Raymundo, ya citadas, se introduxeron simientes de este Holco de San Ildefonso, y por lo tanto se conoce esta yerba al presente en Aranjuez, baxo el nombre de *Heno blanco de San Ildefonso*.

Es yerba que crece á tres pies de altura; ahija mucho y forma grandes macollas: requiere tierras humedas, en donde tiene tanta ó mas cuenta que el vallico, mezclada con otras yerbas. Es mas apetecida del ganado en heno que verde.

*La Avena alta de los Castellanos*<sup>1</sup>, es una planta que ocasiona bastante perjuicio al labrador en los campos cultivados, es no obstante de muy buena calidad para prados siendo temprana y productiva, aunque algo áspera. Hace pocos años que se introduxo su cultivo en Inglaterra separadamente. Forma un heno excelente mezclada con otras plantas mas suaves. Crece á mas de quatro pies de altura, y prevalece mejor en tierras algo humedas.

*A la Poa trival de los Castellanos*<sup>2</sup>, como á casi la mayor parte de las demás yerbas, no la come con tanta ansia el ganado despues de haber florecido, por endurecerse entonces sus tallos y hallarse ásperos y de poca sustancia. Por esta razon es mas ventajoso segarla quando empieza á echar la espiga; ademas de poderse segar dos veces al año, entonces se refuerza la planta que vuelve á brotar de nuevo con mayor pujanza. Se cria abundantemente en las orillas del río Tajo y cazes de Aranjuez, y prospera en tierras húmedas ó de regadio, en donde es una de las yerbas mas exquisitas para pastos. Es planta perene, tierna y delicada, pero se siente mucho del frio ó de la demasiada calor. Florece temprano, y perfecciona sus simientes en Junio. Se continuará.

<sup>1</sup> Avena elatior de Linneo: Avoine élevée, o fromental de los Franceses: Tall-oat-grass de los Ingleses.

<sup>2</sup> Poa trivialis de Linneo: Paturin ordinaire de los Franceses: Common Meadow-grass, y Rough-stalked Meadow-grass de los Ingleses.