

## **TABLAS**

### **Tabla 1: CRITERIOS DE INCLUSIÓN EN LISTA DE ESPERA PARA TRASPLANTE HEPÁTICO PARA PACIENTES CON INFECCIÓN VIH EN ESPAÑA**

#### **Criterios clínicos:**

- Ausencia de enfermedades definitorias de SIDA previas (excepto TBC pulmonar y Candidiasis esofágica). No neoplasias.
- Otras posibles excepciones: complejo demencia-SIDA e infecciones oportunistas con profilaxis eficaz y buen pronóstico con tratamiento

#### **Criterios inmunológicos:**

- Cifra de CD4 superior a 100 células/mm<sup>3</sup>

#### **Criterios virológicos:**

- RNA-VIH negativo (<50 copias/mL) en tratamiento, o con posibilidad de supresión tras el trasplante en casos de intolerancia o toxicidad previa al mismo.

#### **Criterios de inclusión psiquiátricos:**

- Valoración psiquiátrica favorable
- No consumo de alcohol en los últimos 6 meses y de otras drogas en los últimos 2 años
- Pueden incluirse pacientes estables en programas de metadona

#### **Criterios sociales:**

- Poseer un grado adecuado de estabilidad social y de apoyo familiar

Tabla 2:

TH en pacientes VIH	N=25
Indicación de TH	
-VIH-VHC (carga viral VHC +)	18 (72%)
-VIH-VHC (carga viral VHC -)	2
-VIH-VHB	1
-VIH-VHC-VHB	2
-VIH-VHC-VHB-VHD	1
-VIH-OH	1
Edad en el TH (años)	44 (33-60)
Sexo (% hombres)	80,00%
CHC (%)	5 (20%)
CD4 inclusión	354 (72-1014)
Infecciones oportunistas (n=4)	Cryptococcosis, Pneumocystis, Toxoplasmosis, Rhodococcus
Vía de infección:	
-ADVP:	21 (84%)
-Sexual	1 (4%)
-Hemofilia (transfusión)	3 (12%)
Carga viral VIH positiva en TH	2 (8%)

Tabla 3:

	<b>Pacientes VHC-VIH (n=16)</b>	<b>Pacientes VHC (n=32)</b>	<i>p</i>
<b>Edad (años)</b>	46 (39-60)	48 (36-64)	0.175
<b>Sexo (%hombres)</b>	80,00%	81%	0.784
<b>Meld</b>	19	17	0.52
<b>CHC (%)</b>	19%	44%	0.116
<b>Tratamiento antiviral previo al TH (%)</b>	63%	39%	0.7
<b>Genotipo</b>			
-1	50%	75%	0.01
-3	6%	9%	
-4	37.5%	6%	
<b>Carga VHC basal (mediana, mínimo,máximo ) (UI/ml)</b>	233 000 (98-4178170)	169 000 (11300-9116300)	0.232
<b>Edad donante (mediana)</b>	53 (18-76)	50'5 (14-80)	0.797
<b>Tiempo de seguimiento (días)</b>	1266	1961	0.121

Tabla 4

	<b>Pacientes VIH-VHC (n=16)</b>	<b>Pacientes VHC (n=32)</b>	<b>P</b>
<b>Inmunosupresión</b>			
-FK/CsA+Pdn	50'1%	62'5%	
-FK/CsA+MMF+Pdn	31'3%	28'2%	
-FK/CsA+MMF	18'8%	9'4%	
<b>Rechazo moderado-severo (%)</b>	18'8%	6'3%	0.21
<b>Infecciones post-TH (%)</b>	44%	25%	0.20
<b>Hepatitis colestásica (%)</b>	3 (19%)	3 (9%)	0.20
<b>AI primer año &gt; 9</b>	11%	33%	0.20
<b>Fibrosis primer año &gt; 1 (%)</b>	42%	55%	0.40
<b>Tratamiento antiviral post-TH(%)</b>	6 (37'5%)	21 (65'6%)	0.06

Tabla 5

	Pacientes VIH-VHC (n=16)	Pacientes VHC (n=32)	<i>p</i>
<b>GGT 6º mes (UI/mL)</b>	286(48-2991)	113(25-1331)	0.005
<b>FA 6º mes (UI/mL)</b>	162(106-367)	91(46-388)	0.005
<b>Bilirrubina 6º mes mg/ML</b>	1.7(0.6-6.6)	1.54(0.7-6.4)	0.075
<b>FA 1er año (UI/ml)</b>	173(93-691)	135(53-525)	0.032
<b>GGT 2º año (UI/mL)</b>	598(57-1154)	75(21-304)	0.001

Figura 1: Curvas de Supervivencia

